

СЕРОВОДОРОД

ВЫПОЛНИЛ: СЫЗДЫКОВ РУСЛАН
ГРУППА 9П-11



Сероводород (сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид) — бесцветный газ со сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц. Бинарное химическое соединение водорода и серы. Химическая формула — H_2S . Плохо растворим в воде, хорошо — в этаноле. В больших концентрациях ядовит, взаимодействует со многими металлами.

Огнеопасен. Концентрационные пределы воспламенения в смеси с воздухом составляют 4,5—45 % сероводорода. Используется в химической промышленности для синтеза некоторых соединений, получения элементарной серы, серной кислоты, сульфидов. Сероводород также используют в лечебных целях, например в сероводородных ваннах^[2]..

Нахождение в природе


В природе встречается редко в составе попутных нефтяных газов, природного газа, вулканических газов, в растворённом виде в природных водах (например, в Чёрном море слои воды, расположенные глубже 150—200 м, содержат растворённый сероводород). Образуется при гниении белков (только тех, которые содержат в составе серосодержащие аминокислоты метионин и/или цистеин). Небольшое количество сероводорода содержится в кишечных газах человека и животных.

Физические свойства:


Термически устойчив (при температурах больше 400 °С разлагается на **простые вещества** — S и H₂). **Молекула** сероводорода имеет изогнутую форму, поэтому она полярна ($\mu = 0,34 \cdot 10^{-29}$ Кл·м). В отличие от молекул воды, в сероводороде атомы водорода не образуют прочных межмолекулярных водородных связей, поэтому сероводород является газом. **Раствор** сероводорода в воде — очень слабая сероводородная кислота. Является **сверхпроводником** при температуре 203 К (-70 °С) и давлении 150 ГПа.

Получение сероводорода.

1. В лаборатории H₂S получают в ходе реакции между сульфидами и разбавленными кислотами:




2. Взаимодействие Al₂S₃ с холодной водой (образующийся сероводород более чистый, чем при первом способе получения):




Химические свойства сероводорода.

Сероводород H_2S – ковалентное соединение, не образующее водородных связей, как молекула H_2O . (Разница в том, что атом серы больший по размеру и более электроотрицательный, чем атом кислорода. Поэтому плотность заряда у серы меньше. И из-за отсутствия водородных связей температура кипения у H_2S выше, чем у кислорода. Также H_2S плохо растворим в воде, что также указывает на отсутствие водородных связей).


1. Сероводород – восстановитель. В кислороде H_2S горит, легко окисляется галогенами:




2. Сероводород H_2S – очень слабая кислота, в растворе ступенчато диссоциирует:



3. Взаимодействует с сильными окислителями:



4. Реагирует с основаниями, основными оксидами и солями, при этом образуя кислые и средние соли (гидросульфиды и сульфиды):



Эту реакцию используют для обнаружения сероводорода или сульфид-ионов. PbS – осадок черного цвета.