

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Медицинский колледж им. В. М.
Бехтерева»

На тему: «Паук Каракурт»

Выполнили студентки 18 группы
Исмаилова Рисалат
Исмаилова Муслимат

Каракурт

- Каракурт – ядовитый паук. Длина самки достигает до 2 см. Признаки самка: тринадцать пятно или точки на верхней стороне брюшка
- Еще его называют черной вдовой. Во-первых, потому что именно этот цвет у него окрашено брюшко, голова и ноги. Вдова-потому что самка, размер которой значительно превышает аналогичные параметры самца (10-12 мм, а самец 4-7 мм), съедает своего избранника сразу же после брачной ночи.

Места обитания Каракурта

Пауки Каракурты встречаются в Киргизии , пустынной зоне Казахстана, в степях Астраханской области, средней Азии, Иране, Афганистане, по берегам Средиземного моря и Енисея, в Северной Африке, Южной Европе и на юге России и Украины. Идеальное условие местообитания-там, где жаркое лето и теплая осень. Врагами каракурта являются- осы, наездники, ежи.



Каракурт



Опасность при укусе

Если вы подверглись атаке этого существа, последствия могут быть очень серьезными. Кожу человека не может прокусить паук каракурт. Укус, чреватый серьезными последствиями вплоть до летального исхода

Хелицеры (челюсти) самки настолько прочные и острые, что они прокалывают не только кожу, но и ногти. Особую опасность представляют эти особи в брачный период (июль – конец августа).



Симптомы:

- ломота во всем теле (как при очень высокой температуре)
- боли в пояснице, верхний и нижний пресс
- нарастающая боль, становящаяся невыносимой
- далее температура резко падает, и на человека наваливается слабость
- первыми слабеют ноги, после них - руки, а затем и все туловище
- кожа бледнеет, текут слезы, подступает тошнота, а сердце словно вырывается из груди
- при не оказании помощи-помутнение сознания, перестает оценивать обстановку, узнавать окружающих
- развивается депрессия и страх
- Местно повышается температуры кожи
- мышцы становятся болезненными
- может появиться острая боль в животе (как при аппендиците).

Лечение:

- Противокаракуртовая сыворотка
- в/в новокаин, хлорид кальция, гидросульфат магния
- прижигание укушенного места
воспламеняющейся головкой спички, но не
позднее 2х мин после укуса

➤ Яд каракурта разрушается при высокой температуре, поэтому можно снизить интенсивность его воздействия, если немедленно (в течении 2 минут) прижечь место укуса пламенем горячей спички. Для этого приложите три спички к месту укуса и подожгите их четвертой.



Первая помощь при укусах животных.

▼ **Каракурт.**



▪ Необходимо согреть конечности и тело грелками, много пить.