

Лекция 2

ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ

Производная обратной функции

Пусть для функции $f(x)$ существует обратная функция f^{-1} .

Имеем:

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x; \quad f(f^{-1}(y)) = f(x) = y.$$

По теореме о производной сложной функции:

$$\left(f^{-1}(f(x))\right)' = \left(f^{-1}\right)'(f(x)) \cdot f'(x) = \left(f^{-1}\right)'(y) \cdot f'(x)$$

Производная обратной функции

Так как $f^{-1}(f(x)) = x$, то

$$\left(f^{-1}(f(x))\right)' = \left(f^{-1}\right)'(y) \cdot f'(x) = (x)' = 1$$

Отсюда: $\left(f^{-1}(y)\right)' = \frac{1}{f'(x)}, \quad y = f(x)$

или $f'(x) = \frac{1}{\left(f^{-1}(y)\right)'}, \quad y = f(x)$

Производные элементарных функций

Обратные тригонометрические функции

$$y = \arcsin x, \quad x \in [-1; 1]$$

Имеем: $f^{-1}(y) = \sin y = x, \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{(f^{-1}(y))'} = \frac{1}{(\sin y)'} = \\ &= \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \end{aligned}$$

Производные элементарных функций

Обратные тригонометрические функции

$$y = \arccos x, \quad x \in [-1; 1]$$

Имеем: $f^{-1}(y) = \cos y = x, \quad y \in [0; \pi]$

$$\begin{aligned} (\arccos x)' &= \frac{1}{(f^{-1}(y))'} = \frac{1}{(\cos y)'} = \\ &= \frac{1}{-\sin y} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \end{aligned}$$

Производные элементарных функций

Обратные тригонометрические функции

$$y = \operatorname{arctg} x, \quad x \in \mathbf{R}$$

Имеем: $f^{-1}(y) = \operatorname{tg} y = x, \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

$$\begin{aligned} (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{(f^{-1}(y))'} = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \\ &= \cos^2 y = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1 + x^2} \end{aligned}$$

Производные элементарных функций

Обратные тригонометрические функции

$$y = \operatorname{arcctg} x, \quad x \in \mathbf{R}$$

Имеем: $f^{-1}(y) = \operatorname{ctg} y = x, \quad y \in [0; \pi]$

$$\begin{aligned} (\operatorname{arcctg} x)' &= \frac{1}{(f^{-1}(y))'} = \frac{1}{(\operatorname{ctg} y)'} = \\ &= -\sin^2 y = -\frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 y} = -\frac{1}{1 + x^2} \end{aligned}$$

Таблица производных

$$(c)' = 0$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x} \cdot \log_a e$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

Таблица производных сложной функции

Пусть $u = u(x)$

$$(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$$

$$(e^u)' = e^u \cdot u'$$

$$(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} \cdot u'$$

$$(\log_a u)' = \frac{u'}{u} \cdot \log_a e$$

$$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$$

$$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$$

$$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$$

$$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$$

$$(\operatorname{tg} u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$$

$$(\operatorname{ctg} u)' = -\frac{1}{\sin^2 u} \cdot u'$$

$$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$



$$(\operatorname{arctg} u)' = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$(\operatorname{arcctg} u)' = -\frac{u'}{1+u^2}$$

Гиперболические функции

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) гиперболический косинус | $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ |
| 2) гиперболический синус | $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ |
| 3) гиперболический тангенс | $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ |
| 4) гиперболический котангенс | $\operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ |

Графики гиперболических функций



$ch x$ — чётная функция

$sh x, th x, cth x$ — нечётные функции

Гиперболические функции

Основные соотношения:

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

$$\operatorname{ch} 2x = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x$$

$$\operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x$$

$$\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y$$

$$\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$$

$$\operatorname{th}(x \pm y) = \frac{\operatorname{th} x \pm \operatorname{th} y}{1 \pm \operatorname{th} x \operatorname{th} y}$$

Производные:

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$$

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$$

$$(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$$

$$(\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$$

Основные правила дифференцирования (повторение)

- 1) константу можно выносить за знак производной

$$(c \cdot u)' = c \cdot u'$$

- 2) формула производной суммы

$$(u + v)' = u' + v'$$

- 3) формула производной произведения

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

- 4) формула производной частного

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2} \quad (v(x) \neq 0)$$

Производная сложной функции (повторение)

Пусть функция $g(x)$ имеет производную в точке x_0 , а функция $f(y)$ имеет производную в точке $y_0 = g(x_0)$. Тогда сложная функция $f(g(x))$ имеет производную в точке x_0 , вычисляемую по формуле

$$f'(x_0) = f'(y_0) \cdot g'(x_0), \quad y = g(x)$$

Нахождение производной функции

Пример:

Найти производную функции

$$y = \ln \frac{x^2}{3x-1} - \sin^3 \sqrt{e^{x^2} - 2x}$$

Решение:

Воспользуемся основными правилами дифференцирования:

Логарифмическое дифференцирование

Пусть функция $f(x) > 0$.

По теореме о производной сложной функции:

$$(\ln f(x))' = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$$

Выразим отсюда производную:

$$f'(x) = f(x) \cdot (\ln f(x))'$$

Логарифмическое дифференцирование

Пример 1:

Найти производную функции $y = x^n, \quad n \in \mathbf{N}.$

Решение:

Логарифмическое дифференцирование

Логарифмическое дифференцирование применяется для нахождения производной сложной функции вида

$$y = (f(x))^{g(x)},$$

представляющей собой «функцию в степени функция».

Логарифмическое дифференцирование

Пример 2:

Найти производную функции $y = (\sqrt{x})^{\cos x}$.

Решение:

Производная функции, заданной параметрически

Пусть функция y переменной x задана параметрически:

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad t \in T$$

где функции $\varphi(t)$, $\psi(t)$ определены в некоторой окрестности точки t_0 .

Предположим, что функция $x = x(t)$ имеет обратную функцию $t = t(x)$, определённую в некоторой окрестности точки $x_0 = x(t_0)$, а также существуют производные $x'(t_0)$ и $y'(t_0)$.

$$y'_x = y'_x(t(x)) = y'_t \cdot t'_x = y'_t \cdot \frac{1}{x'_t} = \frac{y'_t}{x'_t}$$

Тогда:
$$y'_x(x_0) = \frac{y'_t(t_0)}{x'_t(t_0)}$$

Производная функции, заданной параметрически

Пример:

Найти производную $\frac{dy}{dx}$ функции, заданной уравнениями

$$x = 2 \sin 2t, \quad y = \cos^2 t.$$

Решение:

Производная функции, заданной неявно

Пусть функция y переменной x задана неявно уравнением

$$F(x, y) = 0$$

Для нахождения y'_x :

1. Дифференцируем тождество по переменной x как сложную функцию, предполагая, что $y = f(x)$.
2. Из полученного уравнения пытаемся выразить $y'_x = f'(x)$.

Производная функции, заданной неявно

Пример:

Найти производную неявной функции, заданной уравнением

$$e^y + x y = e,$$

в точке $x_0 = 0$.

Решение:

math.mmts-it.org