




ІНФІКУВАННЯ ВІЛ (ЕПІДЕМІОЛОГІЯ)

ВІЛ НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ

- ◆ Калові маси,
- ◆ Виділення з носа,
- ◆ Харкотиння,
- ◆ Піт,
- ◆ Блювотні маси (без крові),
- ◆ Слюна,

НЕ МОЖНА ІНФІКУВАТИСЯ ВІА





ВІА ПЕРЕДАЄТЬСЯ

- ◆Кров,
- ◆Сперма,
- ◆Вагінальні виділення,
- ◆Предстальна рідина,
- ◆Грудне молоко.

Біологічні рідини, ступінь не безпеки, яких не встановлено у відношенні до ВІА інфікування

- ❖ Синовіальна рідина,
- ❖ Цереброспинальна рідина,
- ❖ Плевральна рідина,
- ❖ Перитонеальна рідина,
- ❖ Перикардіальна рідина,
- ❖ Амніотична рідина.

Епідеміологічний ризик інфікування ВІЛ

Сексуальні контакти,

Контакт по голці/наркотику,

Комерційний секс,

Полігамія,

Реципієнт крові і її препаратів,

Медичні маніпуляції,

Професійний ризик.

ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ ВІА

СТАТЕВИЙ

ПАРЕНТЕРАЛЬНИЙ

ВАГІНАЛЬНИЙ

АНАЛЬНИЙ

ОРАЛЬНИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ (ВЕРТИКАЛЬНИЙ)

ВАГІТАЛЬ

ПОЛОГИ

ГРУДНЕ

ВИГОДОВУВАННЯ

ПРИ ПОТРАПЛЕННІ ІНФІКОВАНОГО МАТЕРІАЛУ:

БЕЗПОСЕРЕДНЬО В КРОВ

НА СЛИЗОВІ ОБОЛОНКИ

НА ПОШКОДЖЕНУ ШКІРУ

ФАКТОРИ ІНФІКУВАННЯ ВІЛ



РИЗИКИ ІНФІКУВАННЯ ПРИ СЕКСУАЛЬНІЙ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ТИПІВ

Відсутній

Моногамія

Маструбація

Секс на відстані

Петінг

Низький

Захищений секс

«французький
поїлунок»

Перерваний акт

«ЗОЛОТИЙ»,
«серебряний» ДОЩ

високий

Не захищений секс

Секс із
загальними
іграшками і
засобами
захисту

ЙМОВІРНІСТЬ ІНФІКУВАННЯ

- МЕДИЧНА ПАРАНТЕРАЛЬНА МАНІПУЛЯЦІЯ 0,3%
- ОДНОРАЗОВИЙ НЕ ЗАХИЩЕНИЙ ВАГІНАЛЬНИЙ СЕКС – 0,3%
(ЧОЛОВІК 0,1%)
- ОДНОРАЗОВИЙ НЕ ЗАХИЩЕНИЙ АНАЛЬНИЙ СЕКС –
3% (АКТИВНИЙ 0,1%)
- В/В ВВЕДЕННЯ НАРКОТИКІВ – 30%
- ВІД МАТЕРІ ДО ДИТИНИ – 30%




*ПРИ НИЗЬКОМУ ВІРУСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
РИЗИКИ ЗМЕНШУЮТЬСЯ*




Вертикальний шлях інфікування ВІЛ

кров



МОЛОКО



Трансплацентарно

ПІД ЧАС ПОЛОГІВ

ПРИ ГОДУВАННІ ГРУДДЮ

Епідеміологічний ризик інфікування ВІЛ новонароджених

- ІНФІКОВАНА МАМА

- БАТЬКИ З УРАЗЛИВИХ ГРУП

- ПЕРЕБУВАННЯ В КОНТАКТАХ

- ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ І ЇЇ КОМПОНЕНТІВ

- ПАРАНТЕРАЛЬНІ МАНІПУЛЯЦІЇ



**ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!**

КУЛИК В. М.