Решение алгебраических и трансцендентных уравнений

Решить уравнение – это значит:

- установить, имеет ли оно корни
- сколько корней
- и найти значение корней с заданной точностью

Графический метод решения уравнений





$$f(x) = 0$$

$$\varphi(x) = g(x)$$

Пример:

Решить графически уравнение $x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = 0$.

Первый способ.



Второй способ.

$y = x^3$
$y = 2x^2 + 2x - 1$



Ответ: $x = 1$

Задача численного нахождения корней уравнения состоит из двух этапов:

- отделение корней
- уточнение корней

Отделение корней

Корень уравнения $f(x) = 0$ считается *отделенным* на отрезке $[a,b]$, если на этом отрезке уравнение $f(x) = 0$ не имеет других корней

Аналитический метод отделения корней

1) Если непрерывная на отрезке $[a;b]$ функция $F(x)$ принимает на его концах значения разных знаков, то уравнение $F(x)=0$ имеет на этом отрезке, по меньшей мере, один корень

2) Если функция F(x) к тому же еще и строго монотонна, то корень на отрезке $[a,b]$ единственный

f(A)*f(B)<0





Метод половинного деления


f(x)
a
c=a'
b
x


f(x)
a
c =a'
b
x


f(x)
c =b'
b
a
x


f(x)
b
a
x

Алгоритм данного метода:

1.Определить начальные данные (a, b, ε).

2.Если нужная точность достигнута (| b - a | < ε) то п.6

3.Найти середину очередного отрезка (c=(a+b)/2).

4.Если значения функции в точках a и c одного знака (f(a)*f(c)>0), то в качестве следующего отрезка взять правую половину (a=c), иначе левую (b=c).

5.Иди к п.2.

6.Напечатать ответ ((a + b) / 2)

Методом половинного деления уточнить корень уравнения

$$x^4 + 2x^3 - x - 1 = 0$$

лежащий на отрезке [0, 1].

Метод хорд

Применяется в том случае, когда f'(X) и f''(X) не изменяют знака на отрезке [a,b], т.е. функция f(X) на отрезке [a,b] монотонна и не имеет точек перегиба

Метод хорд

$$\frac{y - f(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{x - a}{b - a}$$

$$y = f(a) + \left(f(b) - f(a)\right)\frac{x - a}{b - a}$$

$$x = a - \frac{f(a)}{f(b) - f(a)}\left(b - a\right).$$



Метод хорд

$$\frac{y - f(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{x - a}{b - a}$$

$$x = a - \frac{f(a)}{f(b) - f(a)}\left(b - a\right).$$





$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f(x_i) - f(a)}\left(x_i - a\right),$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f(b) - f(x_i)}\left(b - x_i\right)$$

Найти положительный корень уравнения (методом хорд)

$$x^3 - 0{,}2\,x^2 - 0{,}2\,x - 1{,}2 = 0$$

с точностью ε = 0,01.

Метод Ньютона (касательной)

В качестве исходной точки x_0 *выбирается тот конец интервала* $[a, b]$, *которому отвечает ордината того же знака, что и знак* $f''(x)$.



$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

Метод простой итерации

$f(x) = 0$

$x = \phi(x).$

$\varphi'(x) > 0$





$\varphi'(x) > 0$ $\qquad$ $\varphi'(x) > 0$

Решить уравнение

$$x^3 - x - 1 = 0, \text{ на интервале } 1<x<2$$

i	0	1	2	3	4
x_i	1	1,260	1,312	1,322	1,3243