

ВЫПОЛНИЛА СТУДЕНТКА
СПБ ГБПОУ
«МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ № 2»

ГР. 316 «В»

ЕМЦЕВА Е.В.

Тема: Корь

КОРЬ (ЛАТ. MORBILLI) -

Это широко распространенное острое инфекционное заболевание, встречающееся главным образом у детей и характеризующееся повышением температуры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз и горла и появлением на коже пятнистой сыпи.




По оценкам ВОЗ, в мире в 2011 году от кори умерло 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет.

Она является одной из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день. Для этой инфекции характерна почти 100% восприимчивость — то есть если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным корью — вероятность заболеть чрезвычайно высока.



ВОЗБУДИТЕЛЬ КОРИ (POLINOSA MORBILLARUM) ОТНОСИТСЯ К ПАРАМИКСОВИРУСАМ. СЕМЕЙСТВО PARAMYXOVIRIDAE, РОД MORBILLIVIRUS

Под воздействием внешних факторов
(ультрафиолетовые лучи, свет солнца) он теряет свою
устойчивость и быстро погибает.




Попав во внешнюю среду с капельками слюны, вирус кори
становится нежизнеспособным уже спустя полчаса, а при
высыхании он инактивируется мгновенно.

НО! Возбудитель очень хорошо переносит холод. Так, при охлаждении до - 70
гр., он остается активным и способным вызвать болезнь в течение пяти лет.




Путь передачи инфекции — **воздушно-капельный**.

Источник инфекции — **больной корью**.



Риск заражения высок еще за 3 дня до появления признаков болезни, а также еще 6-8 дней, начиная с появления симптомов кори. Уже с пятого дня от того момента, как у ребенка появится сыпь, заболевший становится не заразным для других людей.



- Взрослые заражаются крайне редко (если не переболели в детстве).
- У переболевших детей, вырабатывается стойкий иммунитет, поэтому заболеть повторно невозможно.

Исключение - патологические изменения иммунной системы или полное ее разрушение.

- После рождения и первые несколько месяце у малышей наблюдается колостральный иммунитет - передается от матери, если она в детстве перенесла болезнь.



КОРЬ

– ЭТО **ВЫСОКОПАТОГЕННОЕ,**
ОПАСНОЕ заболевание

Корь **ВОЗВРАЩАЕТСЯ** в
Европейский регион ВОЗ



2007 г.:
7073 случая



2014 г.:
15 995 случаев

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ...



Корь передается в **6 РАЗ**
легче, чем грипп.

**У КАЖДОГО
ПЯТОГО**



заболевшего корью разовьются
осложнения, такие как ушные инфекции,
пневмония, необратимая потеря слуха
или энцефалит, вплоть до летального
исхода.



Наибольший риск **опасных
осложнений** угрожает детям до
5 лет и взрослым старше 20 лет.



Против кори существуют
безопасные и эффективные
вакцины. Они проходят
тщательные испытания, и за
50 лет использования
зарекомендовали себя как
очень безопасные.



Две дозы вакцины против
кори способны обеспечить
защиту от болезни
практически **на 100%**.

СИМПТОМЫ КОРИ

- Инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) длится от 7 до 14 дней

! Важно помнить, что болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды: температура 38-40 градусов, резкая слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк.

- Позже появляется конъюнктивит.



- Через 2-4 дня после первых симптомов болезни на слизистой оболочке щек -напротив коренных зубов, возникают мелкие беловатые высыпания. (Пятна Вельского-Филатова-Коплика)



- На 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен, которые имеют тенденцию сливаться между собой.
- Сначала она обнаруживается за ушами и на лбу, затем быстро распространяется ниже на лицо, шею, тело и конечности



Мелкие розовые пятна сыпи быстро увеличиваются в размерах, приобретают неправильную форму, иногда сливаются.

В период максимального высыпания, через 2-3 дня после появления сыпи, температура снова может подниматься до 40.5° .

Сыпь держится 4-7 дней.




Рис. 29. Корь. Динамика высыпания:



а — 1-й день высыпания; *б* — 2-й день высыпания; *в* — 3-й день высыпания

На месте пятен остаются очаги коричневой пигментации, через 2 недели кожа становится чистой.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет.

- Воспаление среднего уха (отит)
- Слепота
- Бронхопневмония
- Ларингит
- Энцефалит



ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ

! Корь на первых этапах весьма схожа с вирусным заболеванием, а с появлением сыпи многие путают ее с другими инфекционными болезнями (краснухой, ветрянкой)

- Анализ крови.

При развитии инфекционного заболевания в крови больного наблюдается повышенное СОЭ, плазмоцитоз и лимфоцитоз.
Взятие мазка из зева.

- Общий анализ мочи (о воспалительном процессе свидетельствует наличие белка и высокий уровень лейкоцитов).



- Проведение рентгена легких, если есть подозрение на развитие пневмонии.

ЛЕЧЕНИЕ

Неосложнённой кори

Симптоматическое.

1. постельный режим
2. обильное питье
3. Жаропонижающие
4. средства от насморка и боли в горле
5. отхаркивающие препараты
6. витамины

При тяжелой форме болезни, развитии осложнений или наличии других, индивидуальных факторов, пациента помещают в стационар в инфекционное отделение.



ПОСТЕЛЬНЫЙ
РЕЖИМ



ПРОВЕТРИВАНИЕ
И УБОРКА КОМНАТЫ



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ВАННЫ



ПРОМЫВАНИЕ ГЛАЗ ТЁПЛОЙ
КИПЯЧЕНОЙ ВОДОЙ
ИЛИ 2%-М РАСТВОРОМ СОДЫ



ОБИЛЬНОЕ
ПИТЬЕ



ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
ПРИ НОРМАЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ



ДЕТЯМ – МОЛОЧНО-
РАСТИТЕЛЬНАЯ ДИЕТА

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

- Проведение вакцинации.

Первую — в возрасте 12-15 месяцев, вторую — в 6 лет, перед школой.

- Укрепление иммунитета (прием поливитаминных препаратов, сбалансированное полноценное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе, закаливание).
- Избегание контакта с больным человеком.
- Регулярное проветривание комнаты, где лежит пациент, кварцевание.



КОРЬ

- КОНЬЮНКТИВИТ
- КАШЕЛЬ
- РИНИТ
- ЛИХОРАДКА



СЫПЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ В ВОЛОСЯНОМ ПОКРОВЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОТ ГОЛОВЫ ВНИЗ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ДНЕЙ

БЫВАЕТ У ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ВЫЗВАНА ВИРУСОМ ГЕРПЕСА ЧЕЛОВЕКА 6 ТИПА

ВНЕЗАПНАЯ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЛИХОРАДКА СПАДЕТ, НА ШЕЕ И ТУЛОВИЩЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СЫПЬ, РАСПРОСТРАНЯЯСЬ НА ЛИЦО И КОНЕЧНОСТИ.



КРАСНУХА

- ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
- ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ДО 38 °C
- ВОСПАЛЕННОЕ ГОРЛО
- РИНИТ



УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

СЫПЬ НА МЯГКОМ НЕБЕ

СЫПЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЛИЦЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОТ ГОЛОВЫ ВНИЗ


РОЗЕОЛА

КОРЬ

лихорадка

сыпь

воспаление верхних дыхательных путей



ВИРУС КОРИ



TRUST

ME

I'M A

NURSE