

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.
Д.АСФЕНДИЯРОВА

Тақырыбы: Жұқпалы мононуклеоз

Орындаған: Джанысбаева Насихат

Топ:427-01

Тексерген: Майра Сейлгазиевна.

Жоспары

Негізгі бөлім;

- *Жұқпалы мононуклеоз анықтамасы*
- *Этиологиясы*
- *Клиникалық көріністері*
- *Емдеу әдістері т.б*

Қорытынды;

Пайдаланылған әдебиеттер;

Жұқпалы мононуклеоз- барлық лимфа түйіндерінің, әсіресе мойын бездерінің шошынып Ұлкеюімен, бауыр және көкбауыр Ұлғаюымен, қан айналымында атипті мононуклеарлардың пайда болуымен сипатталатын жедел жұқпалы дерт.



Этиологиясы

Қоздырғышы- адамның В лимфатроптық вирусы (Эпштейн –Барр вирусы, вирусты ашқан ғалымдардың атымен аталған) адамның 4-типінің герпесвирус туыстастығына жатады. Вирустың төзімділігі нашар. Вирусты жоғары температурада , әртүрлі дезинфекция жасаушы заттармен кептірген кезде де тез өледі.

Вирусты тасымалдаушы болып сол аурумен ауыратын науқастар , сонымен қатар сау вирус тасымалдаушылар. Науқас адамнан вирус инкубациондық кезеңде шығады, осы кезең клиникалық көріністермен көрінеді және 4-ші – аптадан 24-ші аптаға дейін аурудан айығу кезеңі.

Берілу механизмі

Ауалы – тамшылы жолмен ,тығыз байланыс арқылы (сүйіскенде,қол арқылы,ойыншықтар және ортақ заттар арқылы).Жыныстық жол арқылы жұғуы мүмкін.



Көбіне науқас болатындар - балалар, жасөспірімдер, 14-29 жас адамдар, көбіне ер адамдар ауырады. Балалық шақта - біріншілік ауырған кезде ауру белгілерсіз респираторлы түрде өтеді, кішкене есейген кезде – белгісіз түрде өтеді. Ал 30-35 жас аралығында көптеген адамдарда қандарында жұқпалы моноклеозға қарсы антидене қалыптасады, сол себепті үлкен адамдарда оның клиникалық көріністері аз көрінеді



Клиникалық көріністеріне жататындар:


- ☐ *Дененің жоғарғы температурасы*
- ☐ *Интоксикация*
- ☐ *Баспа (ангина)*
- ☐ *Лимфа түйіндерінің үлкеюі*
- ☐ *Бауыр және көкбауырдың үлкеюі*
- ☐ *Қандағы өзгерістермен көрінеді*
- ☐ *Т.б.*

Аурудың бастапқы уақытында дененің 38-39 С дейінгі жоғарғы температурасымен ,бастың ауруымен,жүрек айнумен,денедегі ауырлықты сезінеді.Науқастардың көбісінде ауру баяу басталады:ұйқысыздық,әлсіздік, мұрынның бітуі, көздің ісінуі және тағы басқа.

Көбінесе барлық жұқпалы мононуклеозда 3 бірдей белгілері бірден басталады,олар:жоғарғы температура, баспа,лимфа түйінінің үлкеюі.Бастапқы кезеңнің ұзақтығы 4-5 күнді құрайды.

Жұқпалы мононуклеоз кезіндегі баспа.

Баспа көбінесе катаральді түрде болады (миндалиналары таза дақсыз), бірақ кейде миндалиналарда көлемдері әртүрлі жеңіл алынатын қабыршақпен қапталады. Баспа 2 апта және оданда ұзаққа созылады



Емдеу әдістері;

- Режим.Интоксикация болған жағдайда төсекте жату керек.*
- Диета.*
- Медикаменттермен емдеу әдістері*
- Патогенетикалық және симптоматикалық терапия.*
- Өңейті жергілікті шаяу фурацилин,ас содасымен,түймедақпен т.б. ерітінділермен шаяу.*

Антибиотикотерапия-екіншілік бактерия қосылғанда қолданылады.Пенициллиндер тобындағы антибиотиктер, ампициллинді санамағанда(анық токсико-аллергендік реакцияны шақырады)

Жұқпалы мононуклездың профилактикасы.



Спецификалық



Бейспецификалық

Спецификалық профилактика әлі құрастырылмаған.

Бейспецификалық профилактиканың міндеті ағзаның жалпы
иммунды резистенттілігін көтеру үшін арналған.

Қандай жағдайда біз дәрігерге көрінуіміз керек?

Келесі белгілер пайда болғанда міндетті түрде дәрігерге көрінуіңіз керек:

Дененің жоғарғы температурасы $38-39^{\circ}\text{C}$ дейін және интоксикация болған жағдайда(бас ауруы , дененің ауырлауы),баспа (жұтынған кездегі тамақтың ауыруы),лимфа түйіндерінің үлкеюі,әсіресе мойын бөлігінде.Осы жағдайларда көрінуіңіз керек.



Пайдаланылган әдебиеттер:

www.google.ru

www.google.kz

www.yandex.ru

www.medkaz.ru

және т.б.



Назарларыңызаға
Көп рахмет!!