Основные положения теории растворов электролитов, используемых в аналитической химии

Майкл Фарадей
1791 – 1867

Электролиты – вещества, водные растворы которых проводят электрический ток

Неэлектролиты – вещества, водные растворы которых не проводят электрический ток

В 1887 году Аррениус предложил
теорию электролитической
диссоциации

Сванте Аррениус
1859 – 1927

Суть теории: все электролиты при раство-рении в воде распадаются на ионы, создавая электропроводящую среду

Количественно диссоциация электролита в растворе характеризуется степенью диссоциации α

$$\alpha = \frac{N_{\text{дисс}}}{N_{\text{общ}}} = \frac{C_{\text{дисс}}}{C_{\text{общ}}}$$

Выражается в долях единицы или процентах

$$N_{\text{дисс}} = 95, N_{\text{общ}} = 100 \quad \alpha = 0,95 \text{ или } 95\%$$

Классификация электролитов

$\alpha < 3\%$ – слабые электролиты

$3\% < \alpha < 30\%$ – электролиты средней
силы

$\alpha > 30\%$ – сильные электролиты

Сильные электролиты

1. Неорганические кислоты: HNO_3 , HBr , HI , HCl , H_2SO_4 (по первой ступени) и др.
2. Гидроксиды щелочных и щелочно-земельных металлов: NaOH , KOH , Ca(OH)_2 , Ba(OH)_2 , Sr(OH)_2
3. Большинство солей: CaCl_2 , NH_4Cl , Na_3PO_4 , CH_3COONa и т.д.

Слабые электролиты

1. Неорганические кислоты: H_2S , H_3PO_4 , H_2SO_4 (по второй ступени), H_2CO_3 и др.
2. Большинство органических кислот: янтарная, уксусная, щавелевая и др.
3. Аммиак и большинство органических оснований: пиридин, N_2H_4 , NH_2OH , $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ и др.

Общая (истинная) и активная концентрация ионов в растворе

Общая концентрация ионов в растворе определяется молярной концентрацией растворенного электролита

Активная концентрация (активность)– это концентрация свободных, не связанных в ассоциаты ионов

$$a_A = f_A \cdot [A]$$

a_A – активная концентрация вещества A

f_A – коэффициент активности

A – общая концентрация вещества A

Коэффициент активности зависит от ионной силы раствора и заряда иона

$$I = \frac{1}{2} \sum C_i \cdot z_i^2$$

При вычислении ионной силы раствора учитываются концентрации и заряды всех ионов, находящихся в растворе (ионами слабых электролитов пренебрегают)

Задача 1. Рассчитайте ионную силу раствора, содержащего 0,01 М CaCl_2 , 0,02 М HCl и 0,025 М уксусной кислоты.

Решение:

1. Какие электролиты сильные, какие электро-литы слабые.
2. Проверить концентрацию сильных электро-литов.
3. Найти концентрацию каждого иона и ионную силу раствора.

$$C(\text{Ca}^{2+}) = 0,01 \text{ M}$$

$$C(\text{H}^+) = 0,02 \text{ M}$$

$$C(\text{Cl}^-) = 0,04 \text{ M}$$

$$I = \frac{1}{2} \sum C_i \cdot z_i^2$$

$$I = \frac{1}{2} (0,01 \cdot 2^2 + 0,02 \cdot 1^2 + 0,04 \cdot 1^2) = \\ = 0,05 \text{ (моль/л)}$$

Ответ: 0,05 моль/л

Задача 2. Смешали равные объемы 0,02 М раствора серной кислоты и 0,01 М раствора щавелевой кислоты. Рассчитайте ионную силу полученного раствора.

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$C_2 = \frac{C_1 \cdot V_1}{V_2}$$

$$C_2 = \frac{0,02 \cdot X}{2X} = 0,01 \text{ (M)}$$

$$I = \frac{1}{2} \sum C_i \cdot z_i^2$$

$$I = \frac{1}{2}(0,01 \cdot 1^2 + 0,01 \cdot 1^2) = 0,01 \text{ (M)}$$

Ионная сила растворов сильных электролитов, состоящих только из однозарядных ионов, равна их общей молярной концентрации

Расчет коэффициента активности

1. Расчетный путь
2. Используя справочные данные

Водные растворы

$t = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

$I = 0,01 - 0,2 \text{ M}$

Уравнение Дебая – Хюккеля:

$$\lg f_i = -0,509 \cdot z_i^2 \cdot \frac{\sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}}$$

$$I < 0,01 \text{ M}$$

$$\lg f_i = -0,509 \cdot z_i^2 \cdot \sqrt{I}$$

Правило ионной силы (выведено эмпирически Льюисом и Рендаллом)

В разбавленном растворе с данной ионной силой все ионы с одинаковым зарядом по абсолют-ной величине имеют один и тот же коэффициент активности

КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫ

Ионы	Значения коэффициента активност				
	0,0005	0,001	0,0025	0,005	0,0
Ионы неорганических соединений					
H ⁺	0,975	0,976	0,950	0,933	0,9
Li ⁺	0,975	0,965	0,948	0,929	0,9
Rb ⁺ , Cs ⁺ , NH ₄ ⁺ , Ag ⁺ , Tl ⁺	0,975	0,964	0,945	0,924	0,8
K ⁺ , Cl ⁻ , Br ⁻ , I ⁻ , CN ⁻ , NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻	0,975	0,964	0,945	0,925	0,8
OH ⁻ , F ⁻ , HS ⁻ , ClO ₃ ⁻ , ClO ₄ ⁻ , BrO ₃ ⁻ , IO ₄ ⁻ , MnO ₄ ⁻ , OCN ⁻ , SCN ⁻	0,975	0,964	0,946	0,926	0,9
Na ⁺ , ClO ₂ ⁻ , IO ₃ ⁻ , HCO ₃ ⁻ , H ₂ PO ₄ ⁻ , H ₂ AsO ₃ ⁻	0,975	0,964	0,947	0,928	0,9
Hg ₂ ²⁺ , SO ₄ ²⁻ , S ₂ O ₃ ²⁻ , SeO ₄ ²⁻ , CrO ₄ ²⁻ , HPO ₄ ²⁻	0,903	0,867	0,803	0,740	0,6
Pb ²⁺ , CO ₃ ²⁻ , MoO ₄ ²⁻ , SO ₃ ²⁻	0,903	0,868	0,805	0,742	0,6
Sr ²⁺ , Ba ²⁺ , Cd ²⁺ , Hg ²⁺ , S ²⁻ , WO ₄ ²⁻	0,903	0,868	0,805	0,744	0,6
Ca ²⁺ , Cu ²⁺ , Zn ²⁺ , Sn ²⁺ , Mn ²⁺ , Fe ²⁺ , Ni ²⁺ , Co ²⁺	0,905	0,870	0,809	0,749	0,6
Mg ²⁺ , Be ²⁺	0,906	0,872	0,813	0,755	0,6
PO ₄ ³⁻ , [Fe(CN) ₆] ³⁻	0,796	0,725	0,612	0,505	0,3
Al ³⁺ , Fe ³⁺ , Cr ³⁺ , Ce ³⁺	0,802	0,738	0,632	0,54	0,4
[Fe(CN) ₆] ⁴⁻	0,668	0,57	0,425	0,31	0,2
Zr ⁴⁺ , Ce ⁴⁺ , Sn ⁴⁺	0,678	0,588	0,455	0,35	0,2

Задача 3. Рассчитать (по справочнику) коэффициент активности иона калия для ионной силы 0,015 моль/л.

КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ИОНОВ

Ионы	Значения коэффициента активности при ионной силе							
	0,0005	0,001	0,0025	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1
Ионы неорганических соединений								
H^+	0,975	0,976	0,950	0,933	0,914	0,88	0,86	0,83
Li^+	0,975	0,965	0,948	0,929	0,907	0,87	0,835	0,80
$Rb^+, Cs^+, NH_4^+, Ag^+, Tl^+$	0,975	0,964	0,945	0,924	0,898	0,85	0,80	0,75
$K^+, Cl^-, Br^-, I^-, CN^-, NO_2^-, NO_3^-$	0,975	0,964	0,945	0,925	0,899	0,85	0,805	0,755
$OH^-, F^-, HS^-, ClO_3^-, ClO_4^-, BrO_3^-, IO_4^-, MnO_4^-, OCN^-, SCN^-$	0,975	0,964	0,946	0,926	0,900	0,855	0,81	0,76

l		f
0,01	—	0,899
0,025	—	0,850
<hr style="width: 100%;"/>		<hr style="width: 100%;"/>
$\Delta l' = - 0,015$		$\Delta f' = 0,049$

0,01	—	0,899
0,015	—	x
<hr style="width: 100%;"/>		<hr style="width: 100%;"/>
$\Delta l'' = - 0,005$		$\Delta f'' = 0,899 - x$

$$\frac{\Delta l'}{\Delta l''} = \frac{\Delta f'}{\Delta f''}$$

$$\frac{-0,015}{-0,005} = \frac{0,049}{0,899 - x}$$

$$X = 0,899 - \frac{(-0,005) \cdot 0,049}{(-0,015)} = 0,883$$

$$I = 0,015 \text{ моль/л}$$

$$f(K^+) = 0,883$$

Ответ: $f(K^+) = 0,883$

Чем меньше ионная сила раствора,
тем больше коэффициент активности

Для сильно разбавленных растворов

$$(I < 0,0001 \text{ M}) \quad f \approx 1$$

Тогда

$$a_A = [A]$$

Задача 4.

0,3264 г хлорида цинка растворили в 300 мл воды. Рассчитайте активность ионов в растворе.

$$C(\text{ZnCl}_2) = \frac{m}{M \cdot V(\text{л})} = \frac{0,3264}{136 \cdot 0,3} = 0,008 \text{ M}$$

$$I = \frac{1}{2}(0,008 \cdot 2^2 + 0,016 \cdot 1^2) = 0,024 \text{ (M)}$$

$$\begin{aligned}
 \lg f(\text{Zn}^{2+}) &= -0,509 \cdot 2^2 \cdot \frac{\sqrt{0,024}}{1 + \sqrt{0,024}} = \\
 &= -0,2731
 \end{aligned}$$

$$f(\text{Zn}^{2+}) = 0,533$$

$$\lg f(\text{Cl}^-) = -0,509 \cdot 1^2 \cdot \frac{\sqrt{0,024}}{1 + \sqrt{0,024}} =$$
$$= -0,0683$$

$$f(\text{Cl}^-) = 0,854$$

$$a(\text{Zn}^{2+}) = 0,533 \cdot 0,008 = 0,004 \text{ (моль/л)}$$

$$a(\text{Cl}^-) = 0,854 \cdot 0,016 = 0,014 \text{ (моль/л)}$$

Ответ: 0,004 моль/л; 0,014 моль/л.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!