

**Болезни,  
передаваемые  
половым путем**

## Положение с болезнями, передающимися половым путем, в настоящее время

- возросла среди взрослого населения в 16 раз
- в молодежной среде — в 28 раз.  
(болеть стали даже дети 12—14 лет, причем заражаясь самостоятельно, а не от больных родителей).

# Сифилис

Первый признак заболевания сифилисом — появление маленькой ссадинки, или **язвочки**, которую называют твердым шанкром («шанкр» по-французски — язвочка, а твердый, потому что дно язвочки действительно плотное). Где же возникает твердый шанкр? Французские врачи говорят об этом с юмором: «**он возникает на том месте, которым грешил**».



## По его течению сифилис делят на три периода.

Первичный период, или первичный сифилис начинается с появления твердого шанкра и длится 1,5—2 месяца. Через неделю после появления шанкра, увеличиваются лимфатические железы вблизи язвочки. Если она появилась на половых органах, то увеличиваются паховые лимфатические узлы, а если на губах — подчелюстные


# Вторичный период, или вторичный сифилис



# Третичный период



# Проявления на теле человека



Иммунитет **не вырабатывается.**

После излечения человек опять **может заразиться** сифилисом.

Успешность лечения должна быть подтверждена анализами. Первый анализ сдают сразу же после окончания лечения, а затем через



**3, 6 и 12** месяцев. Без такого контроля нельзя быть уверенным в излечении.

# Гонорея

Гонорея — самое **распространенное** венерическое заболевание, которое раньше давало яркую картину болезни, а теперь почти у всех протекает **бессимптомно**. Это делает болезнь еще более опасной, так как нелеченная гонорея переходит в хроническую форму, вызывая стойкое **бесплодие**, **воспаление** мочеполовых **органов** у мужчин и воспаление придатков у женщин.

**Иммунитет** после перенесенного заболевания **не вырабатывается**, поэтому возможно повторное заражение.

# ГОНОКОКК



# Стадии болезни и проявление

Заболевание проявляется через **3-7** суток после заражения;

протекает остро или хронически. Острая гонорея характеризуется выделением **слизи, гноя**, ощущением **щекотания, жжения** и **боли** в уретральном канале, частыми позывами к мочеиспусканию, очень болезненному.

Приблизительно у половины зараженных людей не наблюдается никаких симптомов, особенно в начале заболевания. Наиболее склонны к малосимптомному/бессимптомному течению заболевания женщины.

# Проявления гонореи



# Хламидиоз

- Хламидиоз — инфекционное заболевание, передающееся половым путём.  
Возбудителем болезни служит очень мелкая бактерия, хламидия.  
Последствиями заболевания могут быть бесплодие, внематочная беременность, гнойное воспаление органов малого таза и даже воспаление суставов.
- Диагностика хламидиоза затруднена, дорогостояща и не всегда результативна.

# Хламидия



# проявление

Выделения слизистые или слизисто-гнойные. От нормальных выделений они могут отличаться неприятным запахом или желтоватым оттенком. Могут появиться несильные боли в области наружных и внутренних половых органов, зуд и жжение (в том числе, при мочеиспускании). Боли: у женщин боли внизу живота — в области малого таза, усиление болей перед менструацией, межменструальные кровотечения; у мужчин боли в мочеиспускательном канале, в мошонке, в пояснице, в яичках.

Также у женщины может наблюдаться общая слабость и легкая температура — симптомы интоксикации.

# Проявление хламидиоза



# Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)



*Наиболее важные правила,  
которые нужно соблюдать для  
профилактики СПИДа:*

**НИКОГДА НЕ  
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОБЩИМИ  
ИГЛАМИ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ  
И ДРУГИМИ  
ИНСТРУМЕНТАМИ,  
ПОВРЕЖДАЮЩИМИ  
КОЖУ;**

**пользуйтесь  
презервативами,  
даже если в этом  
нет необходимости  
для предотвращения  
зачатия;**

**прежде чем  
вступить в  
интимные  
отношения,  
хорошо узнайте  
человека;**

- **избегайте сексуальных контактов с людьми, которые имеют много половых партнеров и которых вы можете подозревать в злоупотреблении внутривенными инъекциями;**

при необходимости  
использовать  
донорскую кровь или  
препараты,  
приготовленные на ее  
основе, убедитесь в  
том, что они проверены  
на присутствие вируса

**Уголовная  
ответственность за  
заражение венерической  
болезнью (*Статья 121 УК  
РФ*)**

штраф в размере от 200 до 500  
минимальных размеров оплаты  
труда

# Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией

- ограничением свободы на срок до трех лет
- лишением свободы на срок до пяти лет.
- лишением свободы на срок до восьми лет.
- лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

# Профилактика ИППП

- ◎ **Воздержаться** от «случайных» связей.
- ◎ Никто не даст гарантии, что даже самые «приличные» мужчины и женщины – здоровы.
- ◎ Ни внешний вид человека, ни уровень его образования, ни социальный статус и семейное положение – **НИЧТО** не может говорить о наличии или отсутствии у него венерических заболеваний. При этом сам человек может быть полностью уверен, что здоров, и абсолютно не подозревать о том, что болен. Большинство же **венерических болезней** часто протекают **бессимптомно**.

- Использовать презерватив. классическое средство профилактики ЗППП. Однако эффективность его как средства профилактики венерических инфекций – не 100%.
- Совсем не редкость случаи соскальзывания презерватива. Поэтому перед использованием обязательно прочтите инструкцию.

Будьте здоровы!



**Берегите себя и близких!**