

ИППП - аббревиатура "инфекции, передающиеся половым путем".

Виды ИППП:

бактериальные (сифилис, хламидиоз, гонорея, микоплазмоз, уреаплазмоз и др.);
вирусные (ВИЧ, генитальный герпес, остроконечные кондиломы, ВПЧ и др.);
грибковые (кандидоз или молочница);
протозойные (трихомониаз);
паразитарные (педикулез, часотка).

Наиболее распространенные инфекции и заболевания

- Сифилис.
 - Гонорея.
 - Донованоз.
 - Мягкий шанкр.
 - Венерический лематоз.
 - Также есть и другие заболевания «нового» поколения:
-
- Трихомониаз.
 - Генитальный герпес.
 - Гепатит С и В.
 - Бактериальный вагиноз и прочие.

ВИЧ или вирус иммунодефицита человека.

- Самое опасное заболевание, передающееся половым путем. ВИЧ дает о себе знать далеко не сразу — инкубационный период заболевания длится от 21 до 90 дней. Симптомы возникают только на стадии манифестации инфекционного процесса. Пациенты жалуются на воспаление лимфатических узлов, хроническую слабость, головные боли и потерю аппетита. Характерный признак ВИЧ — воспаление небных миндалин (ангина), которое не проходит длительное время. У больных повышается температура тела до 37-37,5 градусов, при этом нормализовать её с помощью жаропонижающих средств не удастся. Отсутствие антиретровирусной терапии крайне негативно сказывается на состоянии больного. Организм атакуют всевозможные вирусные и бактериальные заболевания: пневмония, герпес, туберкулез, кандидоз. Как следствие развивается СПИД.

Вич



Гепатиты В и С.

- Также имеют много путей распространения, в том числе и половой. При этих опасных заболеваниях происходит изменение структуры и функционирования печени, что проявляется серией характерных симптомов.

Гепатит В.



Сифилис.

- Вызывается бледной трепонемой, или спирохетой, имеет три стадии и может быть врожденным. Способен поражать кожные покровы, слизистые, мягкие и костные ткани, ЦНС. Легко передается не только при половой связи, но и через кровь и бытовые контакты с личными вещами инфицированного больного — носителя трепонемы. Проявляется сыпью, язвами, специфическими образованиями — шанкрами и гуммами. Вторичный и третичный сифилис может протекать с скрытой форме. При отсутствии лечения приводит к многочисленным проблемам со здоровьем и психикой, а затем к смерти.




Fig. 1.



Fig. 2.

Гонорея.

- Еще одна достаточно распространенная ИППП, особенно среди людей в возрасте от 15 до 24 лет. Как и хламидии, она может распространяться при оральном, вагинальном или анальном контакте. И так же, как и при хламидиозе, большинство инфицированных женщин на первых стадиях не замечают никаких симптомов. Однако у мужчин гонорея проявляется практически сразу же. Больных беспокоят гнойные выделения из уретры, болезненное и частое мочеиспускание, дискомфорт в области анального отверстия. При отсутствии своевременной терапии гонорее возникают осложнения. У женщин наблюдаются кровянистые выделения после секса и режущая боль во время него, повышается температура тела и ухудшается общее состояние организма. Гонорея на любой стадии требует быстрого и эффективного лечения.


Гонококк




Боль в животе
или боль при
половом акте

Выделения из
вагалища

Гонорея



У женщин



У мужчин

Боль в почках

Дискомфорт при
мочеиспускании


Залипание уретры

Гнойные выделения
из уртры

Генитальный герпес

- Вирусное заболевание с крайне высокой восприимчивостью. Передается не только при половом акте, но и при контакте «кожа с кожей». Возбудитель — вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ-2). Через сутки после заражения появляются маленькие пузырьки на наружных половых органах. Они сопровождаются зудом и легким пощипыванием. В следующие несколько дней происходит превращение пузырьков в болезненные язвочки, наблюдается лихорадка и увеличение лимфатических узлов. Высыпания — лишь видимая часть болезни. Даже после их исчезновения вирус герпеса остается в организме на всю жизнь. Отсутствие лечения у беременных женщин может привести к серьезным осложнениям, вплоть до смерти плода.

HSV-2 Genital Herpes



Другие способы передачи

- сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз передается при совместном использовании с больным мочалки, полотенца, утки, нижнего белья, загрязненного выделениями;
- бледной спирохетой заражаются через слюнную жидкость, например, во время глубокого поцелуя, докуривания сигареты за больным, применения чужой губной помады, зубной щетки, немытой посуды.