

Қ. А. Ясауи АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

Кафедра: Адам физиологиясы

Факультет: Медицина

Тақырыбы: Невроздық синдром.

Орындаған:

ЖМ: 0023

Қабылдаған: Таубекова. А

Түркістан, 2012



ЖОСПАРЫ:

I. КІРІСПЕ

II. НЕГІЗГІ БӨЛІМ: нефротикалық синдром;
этиологиясымен патологиясы.

III. Қорытынды

IV. Пайдалынған әдебиеттер

Нефротикалық синдром.



- Нефротикалық синдром —құрамында көп мөлшерлі (тәулігіне 3,5 кг) протейунирейя , гироальбумиянимия гиперлипидимия, липодурия және жалпы ісіну кіретін бүйрек ауруларының кейбір турлерінде пайда болатын клинико-лабороториялық симптомдарды комплексі.




DomMedika.com
ординаторская врача

Fibrin between
proliferated cells

Crescent obliterating
the glomerular space

Compressed
capillary loops

Normal
tubules




Этиологиясы.



- Нефротикалық синдромға бүйректің шумақтық бұзылысынан бұзылысымен жүретін ауруларымен жүретін барлық ауруларды әкелуі мүмкін.
- Біріншілік нефротикалық синдромдардың себептері:
- липоидтық нефрит.
- Мембранозды гломерулонефрит және біріншілік нефриттің өзге түрлері- мезангиопролиферативті ошақты гломерулосклероз.
- Екіншілік нефротикалық синдромның түрлері:
- Инфекциялық аурулардан дамыған гломерулонефриттер: стрептококктық инфекцияда инфекциялық эндокардитте, екіншілік мерезде алапесте, В гипотитте, безекте т.б

- Дәнекер тіннің жүйелі ауруларында және жүйелі түрде васкулиттерде дамыған гломерунефриттер жүйелі қызыл жегіде , ревматойдық артритте, геммораргиялық васкулиттерде.
- Бүйректің зат алмасу бұзылысынан зақымдануы (бүйрек амилоидозы , диабеттік гломерусклероз, біріншілік гиперпаратериоз)
- Дәрмектік нефроткалық сиындом- келесі дәрілерді ұзақ қолданғанда , кейде I рет қоланғаннан байқалған:алтын, висмут дәрілері, Д-пиницилоамин, ренген контрастық заттар, каптропил , аминоглюказиттер, цефалоспориндер, эпилепсияға қарсы дәрмектер, сульфанилоамидттер, туберкулезға арсы дәрілер.





- **Уытты невропатиялар** (ауыр металдардың қосындыларының жыланның немесе жәндіктердің уыттарынан дамиды.
- **Ісіктік нефропатиялар** (лимфомада, лимфолейкозда, карциномада, лимфогарнулиматозда, , меланомада, дамуы мүмкін.
- **Аллергияқ нефропатиялар** полинозда, жәндіктердің шағуынан болатын;
- **Жүктілік нефропатия,**
- Бүрек артериясының немесе тромбозының тромбозы.
- Бүйректің трансплантациясы.



Normal
glomerulus

ANCA
glomerulonephritis







Diagram of
glomerular
inflammation
(glomerulonephritis)



Glomerular
inflammation
(glomerulonephritis)
in a kidney biopsy
from a patient with
ANCA vasculitis

Патогенезі .




- Нефротикалық синдром зақыманған шумақ фильтрінен белоктың аса көп мөлшерде жоғарлуынан дамиды. Жоғалтылатын белоктың мөлшері тәуләігіне 3,5 – тен асқанда жойылған белоктың орнын бауыр толықтырып үлгермейді.. сондықтан қандағы мөлшері азаяды. Нефротикалық синдромға тән ісіну гиперпротинимия салдарынан болады.

•






Строение нефрона



Асқынулары :



- Нефротикалық синдромның асқынулары спонтанды дамиды. Немесе асқынуына ятрогендік ықпалдар алып келеді Ең жиі асқынулары :
- Флеботромбоздар және тромбоэмболиялар (өкпе артериясының , бүйрек артериясының тромбоэмболиясы , инсульт ,миокард инфаркты;) тромбоэмболиялық асқынулар гепаринді күрт үзгенде дамуы мүмкін.
- Инфекцияның қосылуы пневмания , плевриттің плевра эмпиемасына айналуы, ісінген теріге тілме , ашық түсуі:
- спонтанды пневмоторакс а- антирипсин жетіспеушілігінен. бас миының ісінуі(сирек кездеседі)
- аллергиялық , көбіне болатын тағамдық аллерген (сутке , шоколад, апельсинге) т.б
- Нефротикалық криз-бұл нефротикалықсиндромның классикаалық түрі.



c)

НАЗАР
АУДАРҒАНДАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

