




# Царство Вирусы

# план

- Понятие о вирусах
- Размеры вирусов
- История изучения вирусов
- Строение вируса
- Свойства вирусов
- Классификация вирусов
- Значение вирусов



# Понятие о вирусах

- Ви́рус (от лат. *virus* — яд) — микроскопическая частица, способная инфицировать клетки живых организмов. Вирусы являются облигатными паразитами — они не способны размножаться вне клетки. В настоящее время известны вирусы, размножающиеся в клетках растений, животных, грибов и бактерий (последних обычно называют бактериофагами).



# Размеры вирусов

- Мельчайшие живые организмы
- Размеры варьируют от 20 до 300нм
- В среднем в 50 раз меньше бактерий
- Нельзя увидеть с помощью светового микроскопа
- Проходят через фильтры, не пропускающие бактерий



# История изучения вирусов


- В 1852 году русский ботаник Дмитрий Иосифович Ивановский получил инфекционный экстракт из растений табака, пораженных




Палочковидная частица  
вируса табачной мозаики.  
Цифрами обозначены:  
(1) РНК-геном вируса,  
(2) капсомер, состоящий всего  
из одного протомера, (3) зрелый  
участок капсида.

# История изучения вирусов

- В 1898 году голландец Бейеринк ввел термин «вирус» (от латинского – «яд»), чтобы обозначить инфекционную природу определенных профильтрованных растительных жидкостей



# Строение вируса



- Схематичное строение вируса:

- 1 - сердцевина (однонитчатая РНК); 2 - белковая оболочка (капсид); 3 - дополнительная липопротеидная оболочка; 4 - капсомеры (структурные части капсида).

# Свойства вирусов

- Мельчайшие живые организмы
- Не имеют клеточного строения
- Способны жить и воспроизводиться, паразитируя внутри других клеток.
- Большинство вызывает болезни
- Устроены очень просто
- Находятся на границе живого и неживого
- Каждый тип вируса распознает и инфицирует лишь определенные типы клеток

# КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ

## ДЕЗОКСИВИРУСЫ

## РИБОВИРУСЫ

### 1. ДНК двухнитчатая

#### 1.1. Кубический тип симметрии:

1.1.1. *Без внешних оболочек:*  
аденовирусы (см рис 3в)

1.1.2. *С внешними оболочками:*  
герпес-вирусы(см рис 3б)

#### 1.2. Смешанный тип симметрии:

Т-четные  
бактериофаги (см.  
рис 4)

#### 1.3. Без определенного типа симметрии:

оспенные вирусы

### 2. ДНК однонитчатая

#### 2.1. Кубический тип симметрии:

2.1.1. *Без внешних оболочек:*  
крысиный вирус  
Килхама,  
аденосалеллиты

### 1. РНК двухнитчатая

#### 1.1. Кубический тип симметрии:

1.1.1. *Без внешних оболочек:*  
реовирусы, вирусы  
раневых опухолей  
растений

### 2. РНК однонитчатая


#### 2.1. Кубический тип симметрии:

2.1.1. *Без внешних оболочек:*  
вирус полиомиелита  
(см.рис 3г),  
энтеровирусы,  
риновирусы


#### 2.2. Сpirальный тип симметрии:

2.2.1. *Без внешних оболочек:*  
вирус табачной  
мозаики

2.2.2. *С внешними оболочками:*  
вирусы гриппа(см рис  
3а), бешенства,  
онкогенные РНК-  
содержащие  
вирусы




А




Б

Схематичное  
изображение  
расположения  
капсомеров  
в капside вирусов.  
Сpirальный  
тиp симметрии имеет  
виrus гриппа - а. Кубический  
тиp симметрии у вирусов:  
герпеса - б, аденоvируса - в,  
полиомиелита - г.



В




Г

# Значение вирусов

## 1. Заболевания человека


- корь, свинка, грипп, полиомиелит, бешенство, оспа, желтая лихорадка, трахома, энцефалит, некоторые онкологические (опухолевые) болезни, СПИД, бородавки, герпес.



Ребенок, больной оспой

# СПИД. ВИЧ.

Вирус иммунодефицита  
человека



■ Многие путают два совершенно различных понятия - ВИЧ-инфицированный и больной СПИДом. Разница заключается в том, что человек, инфицированный вирусом иммунодефицита, может в течение многих лет оставаться работоспособным, относительно здоровым человеком. Такой человек не представляет никакой опасности для окружающих

Трехмерное изображение вируса СПИДа

## 2. Заболевания животных

- У животных вирусы вызывают ящур, чуму, бешенство; у насекомых - полиэдроз, грануломатоз.



Вирус бешенства

# **3. Заболевания растений**

- у растений - мозаику или иные изменения окраски листьев либо цветков, курчавость листьев и другие изменения формы, карликовость; наконец, у бактерий - их распад.




## 4. Бактериофаги - "пожиратели бактерий"

- Открыты в 1917 году одновременно во Франции и Англии
- Используются при лечении заболеваний, вызываемых некоторыми бактериями (чума, тиф, дизентерия)



Фотография бактериофага  
(увеличение 500000 раз)



**Схематичное строение Т-фага кишечной палочки со смешанным типом симметрии. 1 - кубоидальная капсидная головка, 2 - двухнитчатая ДНК, 3 - стержень, 4 - спиралеобразный сокращающийся капсид (чехол), 5- базальная пластина, 6 - хвостовые фибриллы.**

# Информационные источники

- Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие/ Авт.-сост. Т.А.Козлова, В. С.Кучменко. – 4-е изд.- М.: Дрофа, 2002.
- Тейлор Д., Грин Н., Старт У. Биология: В 3-х т. Т.1: Пер. с англ./Под ред. Р.Сопера – 3-е изд. – М.: Мир, 2001.
- [http://www.erudition.ru/referat/printref/id.33926\\_1.html](http://www.erudition.ru/referat/printref/id.33926_1.html) - Эрудиция. Электронная российская библиотека.
- <http://schools.keldysh.ru/school1413/bio/vilegzh/index.htm> - Вирусы и их роль в жизни человека -