

ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ

Термин «гидролиз» буквально означает **разложение водой**. Гидролизу подвержены соединения различных классов.

Гидролиз солей – это реакция обменного взаимодействия между солями (ионами солей) и водой (ионами воды).

Гидролиз солей обратим. Обратная реакция – это нейтрализация кислот и оснований.

Пусть НА – кислота, МОН – основание, МА – их соль. Тогда уравнение гидролиза будет иметь вид:




Причиной гидролиза является образование *слабых* электролитов. При этом происходит **связывание** ионов воды ионами растворённого вещества с образованием мало-диссоциированного или труднорастворимого продукта. Это приводит к нарушению равновесия диссоциации воды:



в результате может изменяться кислотность среды (рН раствора). В зависимости от силы кислоты и основания, из которых образована соль, выделяют **четыре** случая гидролиза.

1. Гидролиз солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой



Гидролиз идёт по аниону путём связывания ионов водорода с накоплением гидроксид-ионов **OH⁻**.


В результате реакция среды становится щелочной (**pH > 7**). Полного разложения таких солей не происходит. Степень гидролиза меньше 100%, поскольку образование щелочи – KOH усиливает обратный процесс.

Гидролиз солей с многозарядными ионами происходит **ступенчато** с образованием на промежуточных стадиях кислых или основных солей.

Например, Na_2S в растворе полностью распадается на ионы:



1 ступень




Образование сильного электролита (NaOH) усиливает обратный процесс, подавляя гидролиз по второй ступени.

2 ступень



В обычных условиях гидролиз по 2 ступени практически не протекает.

2. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой



Гидролиз идёт по катиону путём связывания гидроксид-ионов OH^- с накоплением ионов водорода H^+ .

В результате реакция среды становится кислой ($\text{pH} < 7$).
Полного разложения таких солей не происходит. Степень гидролиза **меньше 100%**, поскольку образование сильного электролита (кислоты – HCl) усиливает обратный процесс.

Гидролиз солей с многозарядными ионами происходит ступенчато с образованием на промежуточных стадиях кислых или основных солей.



Образование сильного электролита (кислоты – HCl) усиливает обратный процесс, подавляя гидролиз по второй и третьей ступеням.

3. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и слабой кислотой



Гидролиз идёт и по катиону и по аниону путём связывания обоих ионов воды, в результате среда остаётся практически нейтральной (**pH ≈ 7**).

Степень гидролиза → **100%**.

4. Гидролиз солей, образованных сильным основанием и сильной кислотой






После сокращения одинаковых ионов в обеих частях уравнения остаётся уравнение реакции диссоциации воды:



Вывод: соли, образованные сильным основанием и сильной кислотой, гидролизу не подвергаются. Реакция раствора остается нейтральной (**pH=7,0**).

Совместный гидролиз

Если кислота и основание, образующие соль, не только слабые электролиты, но и малорастворимы или неустойчивы и разлагаются с образованием летучих продуктов, то гидролиз соли часто протекает необратимо, т. е. сопровождается **полным** разложением соли.



Влияние на равновесие при гидролизе солей.

Гидролиз солей - процесс обратимый и протекает с поглощением тепла (эндотермически). При постоянных условиях наступает состояние равновесия, влияние на него подчиняется принципу Ле Шателье:

Если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказано внешнее воздействие, то равновесие сместится таким образом, чтобы уменьшить оказанное воздействие.

Влияние температуры на степень гидролиза. Все реакции нейтрализации протекают с выделением теплоты, а гидролиз - с поглощением теплоты. Выход эндотермических реакций с ростом температуры увеличивается, поэтому степень гидролиза растет с повышением температуры.

$$K_c = \exp[-\Delta H^\circ(T)/(RT) + \Delta S/R].$$

Из данного выражения видно, что влияние температуры на равновесие определяется как абсолютным значением, так и знаком $\Delta H^\circ(T)$.

Изменение концентрации веществ.

Для ослабления гидролиза растворы следует хранить концентрированными и при низких температурах. Кроме того, подавлению гидролиза способствует **подкисление** (в случае солей, образованных сильной кислотой и слабым основанием) или **подщелачивание** (для солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой) раствора.

Для ослабления гидролиза всё наоборот.

$$K_c = \frac{[HA][MOH]}{[MA][H_2O]}$$