Кальций Д3 Никомед

Форма выпуска

- Жевательные таблетки по 20, 50 или 100 таблеток во флакон из полиэтилена высокой плотности.
- Таблетки со вкусом апельсина и мяты.

Показания к применению

- Профилактика и лечение дефицита кальция и витамина Д3.
- Профилактика и комплексная терапия остеопороза



Способ применения и дозы

- Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке 2 раза в день. Детям с 5 лет до 12 лет: по 1-2 таблетки в день.
- Детям с 3-х до 5 лет - дозировка в соответствии с рекомендациями врача.
- Таблетки можно разжевывать или рассасывать и принимать во время еды.

Противопоказания

- Гиперкальциемия (повышенная концентрация кальция в крови).
- Гиперкальциурия (повышенное содержание кальция в моче).
- Гипервитаминоз витамина Д.
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Тяжелая почечная недостаточность.
- Активная форма туберкулеза.
- Саркоидоз.

Побочные действия:

- Зуд, сыпь, крапивница
- Дисфункция ЖКТ (запоры или диарея, метеоризм, тошнота, боль в животе, диспепсия)
- Гиперкальциемия и гиперкалициурия.

Спасибо за внимание!