

АХАЛАЗИЯ ПИЩЕВОДА

Смирнов А.А. 331-П

Ахалазия

- Другие названия:
 - идиопатическое,
 - кардиотоническое,
 - эссенциальное,
 - паралитическое,
 - диффузное расширение пищевода,
 - мегаэзофагус.

- Большое количество названий отражает взгляды разных авторов на этиологию и патогенез заболевания.

Ахалазия

- Нервно-мышечное заболевание кардии, при котором отсутствует рефлексорное раскрытие кардии при глотании.
- **Причина:** отсутствие или недостаточное количество ганглиев в ауэрбаховом сплетении.
- Тонус пищеводного сфинктера нормальный, отсутствует рефлекс расслабления кардии.

Ахалазия

Клиника


- дисфагия, иногда парадоксальная;
- для облегчения – натуживание, глубокие вдохи, запивание пищи жидкостью;
- распирающие, чувство тяжести за грудиной;
- дискомфорт после приема пищи;
- рефлексорная регургитация на высоте глотания;
- аспирация пищи в дыхательные пути → легочные осложнения (хр. пневмония, абсцесс, пневмосклероз);
- уменьшение массы тела;
- авитаминоз.

Ахалазия

Рентгенография ОГК

- дополнительная тень по правому (реже – по левому) контуру средостения;
- уровень жидкости на фоне средостения вследствие задержки в грудном отделе пищевода остатков пищи;
- уменьшение размеров или исчезновение газового пузыря желудка;
- отклонение кпереди трахеи на боковой рентгенограмме.

Ахалазия





Расширение верхнего
средостения в обе
стороны;


дополнительная тень по
правому контуру
сердечно-сосудистой тени;

исчезновение газового
пузыря желудка.


Ахалазия




Ахалазия



Ахалазия






Ахалазия,
IV ст.

Ахалазия

Рентгенологическое исследование

- диффузное расширение пищевода (> в дистальном отделе);
- С- или S-образное искривление пищевода;
- конусовидное сужение абдоминального и наддиафрагмального сегментов пищевода;
- наличие в пищеводе натека жидкости, слизи, остатков пищи (неоднородное контрастирование);
- длительная задержка раскрытия кардии (раскрытие после заполнения пищевода большим количеством бария под действием гидростатического давления);
- нарушение сократительной функции пищевода:
 - третичные сокращения пищевода;
 - атония стенок пищевода (в поздних стадиях);
- отсутствие или резкое уменьшение газового пузыря желудка.

Ахалазия



- диффузное расширение пищевода;
- сужение абдоминального отдела с четкими, ровными контурами;
- переход расширенного отдела в суженный – в виде воронки.

Ахалазия




Ахалазия

Стадии:

1. Спазм кардии без расширения пищевода;
2. Постоянный спазм кардии с умеренным расширением пищевода и сохраненной перистальтикой;
3. Рубцовые изменения терминального отдела с выраженным расширением пищевода, перистальтика отсутствует;
4. Значительное расширение и S-образное искривление пищевода с эрозивными изменениями слизистой оболочки.

Симптомы	Стадия ахалазии			
	I	II	III	IV
Расширение пищевода	-	умеренное	значительное	значительное
Задержка BaSO ₄	временная	длительная	длительная	длительная
Жидкость в пищеводе	-	-	+	+
Перистальтика	обычная	беспорядочная третичная	-	-
Газовый пузырь желудка	+	уменьшен	-	-
Рубцовые изменения кардии	-	-	+	+
Эзофагит	-	-	-	+

Ахалазия






Ахалазия, II ст.

- Диффузное расширение пищевода;
- третичные сокращения пищевода.

Ахалазия, III ст.




- диффузное расширение пищевода;
- задержка контраста в пищеводе;
- сужение абдоминального отдела пищевода;
- воронкообразный переход расширенного отдела пищевода в суженный;
- маленький газовый пузырь желудка.

Ахалазия, III ст.



Ахалазия, III ст.






Ахалазия, III ст.


- диффузное расширение пищевода;
- задержка контраста в пищеводе;
- пестрое контрастирование из-за наличия натовок содержимого;
- сужение абдоминального отдела пищевода;
- воронкообразный переход расширенного отдела пищевода в суженный.

Ахалазия




- диффузное расширение пищевода;
- горизонтальный уровень жидкости в пищеводе;
- стенки пищевода не изменены

Ахалазия



- диффузное расширение пищевода;
- большое количество содержимого в пищеводе;
- стенки пищевода тонкие

Ахалазия, IV ст.



Ахалазия

- У детей ахалазия пищевода чаще всего диагностируется после пятилетнего возраста. На появление первых симптомов, как правило, никто особого внимания не обращает, поэтому диагностируют болезнь с опозданием.
- Самыми распространенными симптомами ахалазии пищевода у детей являются дисфагия и рвота сразу после приема пищи.

Диагностика ахалазии пищевода

- На разных стадиях ахалазии имеется только обструкция кардии с несущественной дилатацией проксимального отдела.
- По мере прогрессирования заболевания на рентгене можно увидеть характерные признаки: расширение пищевода, в нижнем отделе клиническое сужение на небольшом протяжении с клювовидным расширением на месте суженного отдела.
- Несмотря на то, что клиническая картина заболевания довольно характерна, часто у пациентов в возрасте после 50 лет ее можно спутать с раком пищевода, особенно на ранних его стадиях.
- Наибольшую пользу в диагностике ахалазии оказывает эзофагоскопия.

Лечение ахалазии

- Медикаментозное: очень плохо поддается, применение: облегчения симптомов болезни. Пациенту назначают щадящую диету, седативные средства, комплексы витаминов, антиспастики
- Оперативным методом лечения ахалазии пищевода является двусторонняя кардиомиотомия. (наиболее предпочтительный метод лечения ахалазии пищевода у детей на запущенных стадиях.)



**Спасибо за
внимание**