

Селекция. Методы селекции

Селекция ([лат. *selectio*](#) «выбирать») — наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений, [штаммов](#) микроорганизмов, с полезными для человека свойствами. *Селекцией* называют также отрасль сельского хозяйства, занимающуюся выведением новых [сортов](#) и [гибридов](#) сельскохозяйственных культур и [пород ЖИВОТНЫХ](#).

- **Порода, сорт, штамм** — это популяция организмов, полученных в результате селекции, которые характеризуются определенным генофондом, наследственно закрепленными морфологическими и физиологическими признаками и определенным уровнем продуктивности.

Задачи селекции

Повышение урожайности сортов и продуктивности животных

Повышение устойчивости к заболеваниям

Улучшение качества продукции

Пригодность для механизированного или промышленного выращивания и разведения

Экологическая пластичность сортов и пород

Порода животных - это совокупность особей в пределах определенного вида животных, яко имеет генетически обусловленные стабильные характеристики (свойства и признаки), отличающие ее от других совокупностей особей этого вида животных, устойчиво передают их потомкам и является результатом интеллектуальной деятельности человека.

Сорт растений - группа культурных растений, которые в результате селекции получили определенный набор характеристик (полезных или декоративных), которые отличают эту группу растений от других растений того же вида. Каждый сорт растений имеет уникальное название и сохраняет свои свойства при многократном выращивании.

Штамм микроорганизмов - чистая культура определенного вида микроорганизмов, морфологические и физиологические особенности которой хорошо изучены. Штаммы могут быть выделены из различных источников (почвы, воды, пищевых продуктов) или из одного источника в разное время

Методы селекции

Основными методами селекции являются **гибридизация и отбор**

Основой селекционной работы является **искусственный отбор**, позволяющий в короткое время и при ограниченном числе особей получить нужный сорт, породу или штамм

Методы отбора

Массовый отбор:

Применяется для получения сортов перекрестноопыляемых растений. Все потомки гетерозиготны. Результаты неустойчивые из-за случайного перекрестного опыления

Индивидуальный Отбор:

Применяется для самоопыляемых растений. Отбираются отдельные растения и от них получают потомство, которое генетически однородно. Получают чистые линии

Естественный Отбор:

Формируется устойчивость к среде обитания. Получают районированные сорта и породы

Гибридизация – это получение гибридов от скрещивания генетически разнообразных организмов

Методы гибридизации

1 сорт (порода)

+

2 сорт (порода)



Новый сорт (порода)

Инбридинг

Гетерозис

Полиплоидия

Отдаленная гибридизация

ЦМС (цитоплазматическая мужская стерильность)

Искусственный мутагенез

Генная инженерия





N. I. Vavilov




Селекция – это комплексная наука, теоретической основой которой является генетика.

Основоположником теоретической селекции является **Н.И. Вавилов**, который и определил основные задачи этой науки.

С 1924 и по 1939 годы Н.И. Вавилов организовал 180 экспедиций с целью изучения многообразия и географичес-

кого распространения культурных растений. В ходе экспедиций было собрано более 250000 образцов растений из различных регионов земного шара, которые до сих пор используются в качестве исходного материала для выведения новых сортов растений. Экспедиции позволили Вавилову выявить мировые очаги (центры происхождения) культурных растений.



Центры происхождения культурных растений: 1 – Тропический центр; 2 – Восточноазиатский; 3 – Среднеазиатский; 4 – Переднеазиатский; 5 – Средиземноморский; 6 – Абиссинский; 7 – Центральноамериканский; 8 – Южноамериканский.




Тропический центр


Включает территорию тропической Индии, Индо-Китая и островов Юго-Восточной Азии.

Из этого центра ведет начало около 30% возделываемых в настоящее время растений. Более 1 млрд. человек до сих пор проживает на этой территории.

Здесь родина **риса**, **сахарного тростника**, **большого количества тропических плодовых и овощных культур** (цитрусовые, баклажан, огурец и др.)



Рис




Огурец




Восточноазиатский центр

Включает умеренные и субтропические части Центрального Китая, Корею, Японию и о. Тайвань. Около 20% всей мировой культурной флоры ведет начало из Восточной Азии.


Это родина таких растений, как **соя**, **проса**, **многих овощных и плодовых культур** (яблоня, груша, слива, вишня и др.)





Среднеазиатский центр: включает территории Ирана, Афганистана, Средней Азии и Северо-Западной Индии. Это родина: пшеницы, фасоли, гороха, ржи, льна, конопли, лука, чеснока, винограда, дыни, тюльпанов и роз (14%).

Переднеазиатский центр: территория Малой Азии и Кавказ. Родина шпината, грецкого ореха, миндаля, пшеницы, ржи, граната, хурмы.



Среднеазиатский центр




Роза

Дыня


Чеснок




Переднеазиатский центр




Шпинат



Грецкий орех



Средиземноморский центр: включает страны, расположенные по берегам Средиземного моря. Этот центр дал начало 10-11% видов культурных растений. Среди них такие, **как маслины, капуста, спаржа, петрушка, свекла и кормовые травы (клевер и др.)**





Капуста



Клевер


Спаржа



Абиссинский центр



Включает территории Эфиопии, части Судана, Сомали и юга Аравийского полуострова. Здесь много эндемичных растений: нуг, кофейное дерево, особый вид банана, арбуз, твердая пшеница, ячмень, сорго (всего 3-4%)




Арбуз




Ячмень



Центральноамериканский центр: охватывает большую территорию Мексики и Центральной Америки. Из этого центра ведет начало около 8% различных культурных растений, таких как **кукуруза**, **подсолнечник**, хлопчатник, фасоль, тыква, какао, авокадо, табак.




Кукуруза



Белая акация



Подсолнечник




Земляника




Южноамериканский центр:

территория западного побережья Южной Америки – Колумбии, Перу и Чили.


Это родина **картофеля, томата, арахиса, ананаса, хинного дерева и кокаинового куста.**




Арахис



Картофель



Томат



И. В. Мичурин

- Большой вклад в развитие селекции растений внесли работы И.В. Мичурина.
- Мичурин скрещивал местные морозостойкие сорта с южными, а полученные сеянцы подвергал строгому отбору и содержанию в суровых условиях. Так были получены сорта яблонь **Антоновка, Славянка**.
- Он предложил **метод ментора**, при котором признаки гибрида изменяются под влиянием привоя или подвоя. Таким путем был получен сорт яблони **Бельфлер-китайка**.
- Для преодоления нескрещиваемости видов он предложил:
 1. **Метод предварительных прививок;**
 2. **Метод посредника;**
 3. **Опыление смесью пыльцы.**

- **1. Метод предварительных прививок:** изменение химического состава привоя (*рябина на груше* → *опыление* → *гибрид*)
- **2. Метод посредника:** культурный персик + монгольский миндаль → гибрид (посредник) + культурный персик → морозостойкий персик.
- **3. Опыление смесью пыльцы:** пыльцевые трубки с различным генотипом стимулируют друг друга для прорастания и оплодотворения.
- Полученные Мичуриным сорта культурных растений являются гетерозиготными, поэтому для сохранения сортовых качеств, применяют вегетативное размножение – прививками, отводками и черенками.
- Применяя метод гибридизации, И.В. Мичурин получил гибриды *малины и ежевики*, *рябины и боярышника*, *терна и сливы*.



Антоновка полторафунтовая. Получен в виде почковой вариации на одной из ветвей старого сорта Антоновки могилевской белой.



?

Актинидия ананасная

Мичуринская. Прекрасный сорт получен путем селекции от третьей генерации Актинидии коломикты Макс.

Вишня Краса севера.

Получена от опыления вишни Владимирской пыльцой черешни Винклера белая.





Бельфлер – китайка. Получена от скрещивания китайской яблони (слева внизу) и Бельфлера желтого американского (слева вверху).

Груша Бере зимняя Мичурина.
Получена от скрещивания Уссурийской дикой груши (слева вверху) и иностранной груши Бере рояль.





Северный бужбон. Получен путем опыления сорта Бужбона смесью пыльцы сортов Эдельротер и Эдельбемер.

Кандиль-китайка. Получена от скрещивания китайки (слева вверху) и Крымского сорта Кандиль-синап.



Слива Ренклюд реформа

(справа). Получена путем
гибридизации Ренклода зеленого
(слева вверху) и тернослива (внизу)



Чернослив Козловский.

Получен путем гибридизации
терносливы и венгерки Анна
Шпет



Рябина Мичуринская
десертная. Лучший сорт по
вкусовым качествам. Получен от
скрещивания рябины Ликерной с
мушмулой.

Шафран – китайка. Сорт
получен путем опыления Ренета
орлеанского пыльцой китайской
садовой яблони.





Малина тexas. Ягоды до 4 см длины и весом до 10 г. Получена путем отбора из семян американской ежевики Логан

Абрикос лучший Мичуринский. Сорт произошел от отборного семянца монгольского абрикоса.



- В селекции растений очень широко используется **отдаленная гибридизация**.
Впервые в 1760 г. И.Г. Кёльрейтер вывел межвидовой гибрид табака. В 1888 г. немецкий селекционер Ришпау получил гибрид пшеницы и ржи, названный **тритикале**. Сейчас много сортов тритикале: **Житница 1, Ставропольская 1, ВОСЕ 1**.
- Научную методику получения плодовых межвидовых гибридов предложил в 1924 г. Г.Д. Карпеченко. Для скрещивания редьки и капусты он с помощью **колхицина** удвоил набор хромосом и плодовитость восстановилась. Был получен гибрид **Рафанобрассика**.
- **Использование полиплоидии** для преодоления стерильности гибридов очень широко используется в селекции растений.
Н.В. Цицин таким путем скрестил пшеницу с пыреем ползучим и получил **многолетнюю пшеницу**.



Размеры зерна у диплоидной ржи (слева) и тетраплоидной ржи (справа)

Достижения селекции растений

Академик П.П. Лукьяненко создал ряд высокоурожайных сортов озимой пшеницы: **Безостая 1 (50 ц/га), Аврора и Кавказ (100 ц/га)**

Академик В.В. Ремесло создал сорта яровой пшеницы: **Мироновская 264 и 808 (60-70 ц/га) и Ильичевка (100 ц/га).**

В.Н. Мамонтов и А.П. Шехурдин создали яровой сорт пшеницы **Саратовская 29 (до 80-90 ц/га)**

Академик В.С. Пустовойт вывел сорт подсолнечника, содержащего до 50% масла в семенах.

Академику Н. В. Цицину удалось создать гибрид пшеницы яровая пшеница **Новосибирская 67 (до 45 ц/га в Западной Сибири)** была получена путем искусственного мутагенеза.

Получен сорт картофеля дающий урожай почти в 1000 ц/га, что в 4 раза выше среднего урожая по стране.

Районы одомашнивания животных



Селекция животных происходила в тех же центрах, что и растений и началась видимо случайно. Пойманные детеныши содержались в неволе, и те, которые смогли выжить и не вели себя агрессивно по отношению к человеку оставались, т.е. отбор был по поведению и способности жить в неволе.

Выделяют 8 районов одомашнивания животных:

1. Передняя Азия. 9-10 тыс. лет назад из дикого барана Муфлона была одомашнена **овца**.



6. Североафриканский.

Около 3,5 тыс. лет назад из дикой камышовой кошки была одомашнена **кошка**.

2. Индонезийско-Индокитайский.

Были одомашнены **собака** (от волка 10 тыс. лет), **свинья** (камышовый кабан 8 тыс. лет), **куры** (красные куры Фиджи), **утки и гуси** (от диких уток и гусей).

3. **Малая Азия.** Из диких горных коз примерно 7-8 тыс. лет назад одомашнены **козы**.

4. **Евразия.** Были одомашнены **крупный рогатый скот** (от дикого быка Тура 5-6 тыс. лет) и **свиньи** (от дикого лесного кабана 8 тыс. лет).

5. **Степи Причерноморья.** Из дикого тарпана примерно 5-6 тыс. лет назад была одомашнена **лошадь**.



7. Южноамериканский. Около 1 тыс. лет назад была одомашнена **лама** из диких лам и **морская свинка** из обитающих до сих пор в этом районе диких морских свинок.

8. Центральноамериканский. Здесь около 2 тыс. лет назад была одомашнена **индейка** из диких индеек.

ИНБРИДИНГ – близкородственное скрещивание, которое приводит к повышению гомозиготности. Применяется для получения **ЧИСТЫХ ЛИНИЙ**.

Часто приводит к снижению общей жизнестойкости из-за накопления вредных рецессивных аллелей.

Единственный метод, используемый для сохранения сорта или породы в чистом виде.



Сорт яблок «Бужбон»



Буденовская порода лошадей

ГЕТЕРОЗИС – (греч. «изменение») гибридная мощь, явление повышенной урожайности, жизнеспособности, высокой плодовитости гибридов первого поколения от скрещивания разных чистых линий. Потомки превышают по этим показателям обоих родителей.

У гибридов второго поколения гетерозисный эффект почти исчезает.

Гетерозис объясняется переходом большинства генов в гетерозиготное состояние, взаимодействием генов.

Очень широко применяется для получения с/х продукции в растениеводстве и животноводстве. Для его продления используют у растений вегетативное размножение, а у животных скрещивание гибридов первого поколения с новой чистой линией, а их потомков с исходными породами.



ПОЛИПЛОИДИЯ – наследственные изменения, связанные с кратным увеличением основного числа хромосом в клетках растений, приводящее к мощному развитию вегетативных органов, плодов, семян и вкусовых качеств.

Иногда встречается в естественных условиях (картофель, табак, томаты).

Большинство культурных растений – полиплоиды.

Типы полиплоидии

Аутополиплоидия:

Внутривидовая; кратное увеличение набора хромосом (генома)

$2n - 4n - 8n - 16n - 32n$

Аллополиплоидия:

Межвидовая; суммирование геномов разных видов, а затем их кратное увеличение

$1n (14) + 1n (7) = 2n (21) - 4n (42)$

ОТДАЛЕННАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ – скрещивание растений и животных разных видов, а иногда и родов.

Полученные таким образом гибриды бесплодны, т.к. хромосомы разных видов негомологичны и не могут конъюгировать при мейозе (не происходит образования гамет).

В 1924 г. Г.Д. Карпеченко нашел способ преодоления бесплодия у таких гибридов растений – путем удвоения числа хромосом и получения полиплоида. В результате у каждой хромосомы появляется свой гомолог.

У животных это достигается путем сложных заводских скрещиваний, т.к. все полиплоиды у них гибнут в эмбриональном состоянии.

Применяется для получения высоких и стабильных урожаев растений и продуктивности животных.



ЦМС (ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МУЖСКАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ)

В 1929 г. генетик М.И. Хаджинов нашел в посевах кукурузы растения с мужской стерильностью и предложил использовать это явление для получения гибридных семян у **обоеполых и самоопыляемых** растений. Стерильность обусловлена взаимодействием особого типа цитоплазмы **S** и генов **rf**. В практике используются лишь семена гибридных растений первого поколения от скрещивания двух чистых линий, дающее урожайность на 20-30% выше.




Схема наследования ЦМС


Внедрение гетерозисных гибридов растений приносит значительный чистый доход производителям продукции с/х



ИСКУССТВЕННЫЙ МУТАГЕНЕЗ

ИМ – искусственное получение мутаций путем воздействия радиационного излучения и химических веществ на семена растений, приводящее к изменению генов.

Таким методом создаются новые сорта томатов, картофеля, кукурузы, хлопчатника, пшеницы.



Очень широко искусственный мутагенез используется в селекции микроорганизмов



ГЕННАЯ И КЛЕТОЧНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Клеточная инженерия – метод получения новых клеток и тканей на искусственных питательных средах. В основе метода лежит высокая способность растительных клеток к регенерации и из одной клетки вырастает целое растение.

Генная инженерия основана на пересадке генов из одних организмов в другие. **Этапы генной инженерии:**




Растения и животные, геном которых изменен таким путем, называются **трансгенными**.

Около 40% культурных растений, выращиваемых на Западе являются трансгенными.



Технология рекомбинантных ДНК (молекулярное клонирование)



- 1. Из организма донора извлекают нужную ДНК, подвергают ее ферментативному гидролизу и извлекают нужный ген.
- 2. У бактерий или других клеточных структур извлекают вектор (плазмиду) и его разрезают.
- 3. Вставляют в вектор фрагмент ДНК.
- 4. Полученную конструкцию вводят в клетку хозяина, где она передается потомкам.
- 5. Получают специфический белковый продукт, синтезируемый клетками хозяина.



Направления генной инженерии

- **1. Производство пищи:** Трансгенные растения содержат все необходимые аминокислоты, микроорганизмы производят все необходимые ферменты, витамины и дешевый белок, а продуктивность животных увеличилась в 3-5 раз. Стало возможным производство пищи минуя животноводство и растениеводство, только из микроорганизмов. Пока остается главным - генная селекция растений, животных и бактерий с целью повышения продуктивности, устойчивости к болезням и абиотическим факторам и внедрения генов животных в гены растений.
 - **Новые растения:** *Соккура* (соя + кукуруза), *сотоба* (соя + табак), *картомидор* (картофель + помидор).
- **2. Производство источников энергии и новых материалов:** бензин заменяют этиловым спиртом, полученный бактериями из растительного сырья. Использование «биогаза», искусственной нефти, солянки из бытовых отходов. Производство искусственных тканей с помощью микроорганизмов. Получение пластмасс путем синтеза окиси пропилена.
- **3. Генная инженерия в медицине:** производство лекарств (инсулин, интерферон, соматотропин, антибиотики, вакцины, витамины), генная терапия: выделение поврежденного гена и переноса нормального в клетку (генные болезни обмена веществ)