


Решению задач с помощью
законов Ньютона.

Повторение


Укажите силы, действующие на тело





Укажите силы, действующие на тело,
свершающего поворот




Укажите силы, действующие на связанные тела




Укажите силы, действующие на тело,
соскальзывающего с плоскости



Укажите силы, действующие на тело,
если оно движется по выпуклому мосту




Укажите силы, действующие на тело,
если оно движется по вогнутому мосту



Равнодействующая сил

I закон Ньютона:

Материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит ее изменить это состояние



II закон Ньютона:

В инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально векторной сумме всех действующих на тело сил и обратно пропорционально массе тела:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

Движение под действием нескольких сил

- Тело движется по горизонтали
- Тело движется по наклонной плоскости
- Тело движется по мосту
- Тело движется на подвесе
- Тело движется на блоке

Тело движется по горизонтали

$$F_{TP} + F + mg + N = ma$$

$$\begin{cases} F_{TP} - F = ma \\ N - mg = 0 \end{cases}$$

$$N = mg$$

$$F_{TP} = \mu N = \mu mg$$

$$ma = F_{тяги} - \mu mg$$



тело движается равноускоренно

$$ma = \mu mg - F_{тяги}$$

тело движается равнозамедленно

$$F_{тяги} = F_{TP}$$

тело движется равномерно !



Тело движется по наклонной плоскости

$$m\vec{a} = \vec{F}_{mp} + \vec{N} + m\vec{g}$$

$$mg_x = mg \sin \alpha$$

$$F_{тр} = \mu mg \cos \alpha$$


$$ma = mg \sin \alpha \pm \mu mg \cos \alpha$$

тело вверх (+), вниз (-).

$$mg \sin \alpha = \mu mg \cos \alpha$$


тело покоится

$$a = g (\sin \alpha \pm \mu \cos \alpha)$$




$$\mu = \tan \alpha, \text{ если тело скользит равномерно}$$

$$a = g \sin \alpha, \text{ тело скользит без трения !}$$



Тело движется по мосту



N



mg

$$a = \frac{v^2}{r}$$

$$\frac{mv^2}{r} = mg - N$$

$$mg + N = ma$$


N




mg

$$\frac{mv^2}{r} = N - mg$$

!




Тело движется на подвесе вверх



$$mg + N = ma$$

$$ma = N - mg$$


Тело движется на подвесе вниз




$$mg + N = ma$$

$$ma = mg - N$$

$mg = N$,
тело покоится !



Тело движется на блоке



$$(m + \Delta m)g - F = (m + \Delta m)a$$
$$mg - F = -ma$$

$$a = \frac{2m + \Delta m}{\Delta m}g$$

$$F = m(g + a)$$

Решение задач

1. Автомобиль массой 1 т поднимается по шоссе с уклоном 30° под действием силы тяги 7 кН. Найти ускорение автомобиля, считая, что сила сопротивления зависит от скорости движения. Коэффициент сопротивления равен 0,1. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2

2. Автомобиль массой $m = 1000 \text{ кг}$ движется со скоростью 36 км/ч по выпуклому мосту, радиус кривизны которого равен 50 м. С какой силой автомобиль давит на мост в его середине. С какой скоростью он должен ехать, чтобы его давление на мост было равно 0.


3. Два тела с массами 10 г и 15 г связаны нитью, перекинутой через блок, установленный на наклонной плоскости. Плоскость образует с горизонтом угол в 30° . найти ускорение, с которым будут двигаться эти тела. Трением пренебречь.

$m = 1 \text{ т,}$
 $F_{\text{тяги}} = 7 \text{ кН,}$
 $g = 10 \text{ м/с}^2,$
 $\alpha = 30^\circ,$
 $\mu = 0,1$
Найти: $a - ?$


Решение:

$$F_{\text{TP}} + F + mg + N = ma$$

тело движется вверх, значит
 $ma = F_{\text{тяги}} - (mg \sin \alpha + \mu mg \cos \alpha)$



$$a = (7000 - (10000 \cdot 0,5 + 0,1 \cdot 10000 \cdot 0,87)) : 1000 = 1,13 !$$



$$m = 1000 \text{ кг},$$

$$v = 36 \text{ км/ч},$$

$$R = 50 \text{ м},$$

$$N_1 = 0$$

Найти:

N - ? v_1 - ?

Решение:

$$\frac{mv^2}{r} = mg - N$$



$$N = mg - \frac{mv^2}{r}$$

$$N = 10000 - 1000 \cdot 100 / 50 = 8000 \text{ Н}$$

$$N = 0, mg = \frac{mv^2}{r}$$

$$10 = v^2 / 50$$

$$V = 22 \text{ м/с} = 80 \text{ км/ч} !$$



$m_1 = 10 \text{ г},$
 $m_2 = 15 \text{ г},$
 $\alpha = 30^\circ$

Найти: a - ?

Решение

Допустим, что груз m_2 перетягивает, тогда

$$m_2 a = m_2 g \sin \alpha - T$$

$$m_1 a = T - m_1 g$$

Исключим силу натяжения нити:

$$m_2 g \sin \alpha - m_2 a = m_1 a + m_1 g$$

$$m_2 g \sin \alpha - m_1 g = m_1 a + m_2 a$$

$$m_2 g \sin \alpha - m_1 g = a(m_1 + m_2)$$

$$a = (1,5 \cdot 0,5 - 1) / 0,25 = -1$$

Знак минус означает, что наше предположение оказалось неверным и движение будет противоположно допущенному.

