

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ



Синица МОСКОВКА

- Синицы питаются мелкими беспозвоночными, семенами, ягодами. Одни из основных истребителей вредных насекомых. Желательно привлекать синиц в сады, развешивать им искусственные гнездовья, подкармливать их зимой
- Вьют гнезда в дуплах, расщелинах, иногда за отставшей корой деревьев. Для привлечения гнездования синицам устраивают искусственные дуплянки. При постройке гнезд используют мягкий строительный материал. Яйца белые с буро-красными крапинками. Линяют 1 раз в год.



БОЛЬШАЯ СИНИЦА

- **Клюв тонкий, у основания густые короткие щетинки. Оперение густое, пушистое.**
- **В окраске преобладают черный цвет с металлическим отливом, оттенки серого и бурого. Очень характерны белые «щеки», у многих видов черная шапочка, у некоторых хохолок.**
- **Крылья закругленные, первое маховое перо короче других первостепенных маховых. Хвост короче крыльев. Ноги сильные, задний палец развит больше других.**



Снегирь.

- СНЕГИРЬ, птица семейства вьюрковых величиной с воробья (длина тела около 18 см).
- У самца на голове черная шапочка. Верх головы и кольцо у основания клюва, крылья и хвост черные. Подхвостье и надхвостье белые, спина голубовато-серая, брюшная сторона розово-красная.
- У самок брюшная сторона серая. Массивный, вздутый у основания короткий клюв черного цвета. Населяет хвойные леса Евразии.
- Оседлая и кочующая птица. Появление снегирей после снега близ человеческих поселений и городов, в садах, огородах и парках скорее всего и лежит в основе их названия — снегирь.
- Кормится семенами сирени, крапивы или почками, в том числе плодовых растений, выкусывая их клювами как кусочками. Голос — громкое «фю-фю» и трескучая песня.





Поползень.

- ПОПОЛЗНИ, род птиц семейства поползневых.
- Наиболее широко распространен обыкновенный поползень
- Питаются поползни насекомыми, семенами, орехами, разыскивая их в расщелинах, трещинах, пазухах листьев, поедают плоды и семена с плотной оболочкой, раскалывая ее ударом клюва.
- Гнезда вьют в дуплах деревьев, в расщелинах скал.



Клёст.

- **КЛЕСТЫ**, род птиц семейства вьюрковых.
- Величиной с воробья или несколько крупнее
- Плотного телосложения. Имеют особое строение клюва: концы надклювья и подклювья заходят, крестообразно перекрещиваясь, друг на друга.
- Из тайги клесты во время своих частых кочевек залетают во все области России, часто очень далеко от мест своих гнездовий.
- Держатся на хвойных деревьях стаями, часто подвешиваясь к шишкам, срывая и роняя их.
- Питаются главным образом семенами хвойных растений. Голос — звонкое «кле-кле», служащее для звуковой связи между стайными птицами. Песня — набор щебетаний с громкими свистами.



Свиристель.



- **СВИРИСТЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ**, птица семейства свиристелевых.
- Величиной со скворца (длина тела 18-20 см). Нарядная птица. Оперение розовато-серое. Горло и полоска от клюва к глазу черные, лоб красноватый. Крылья черные с широкими белыми и узкими желтыми полосками. На голове большой хохол. На конце хвоста поперечная желтая полоса.
- Обитает в хвойных и смешанных лесах. Обыкновенная кочующая птица. Во время кочевок посещает различного типа леса, сады и парки.
- Питается ягодами и насекомыми, обычно ловя их в воздухе. Песня — нежное «свирири-свирири». Гнездо строит на дереве. В кладке 3-7 с голубоватыми пятнами яиц. В зимнее время свиристелей можно увидеть даже на улицах Москвы, куда они прилетают в поисках корма и лакомятся рябиной.

