



СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита



- СПИД — это стадия ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) инфекции, при которой иммунная система человека отказывается защищать своего хозяина.



ВИЧ заражает прежде всего клетки иммунной системы, а также некоторые другие виды клеток.





Вирус ВИЧ обнаруживается в следующих жидкостях организма:

- Сперма
- Кровь
- Лимфа
- Предсеменная жидкость
- Грудное молоко
- Влагалищный секрет


□ Изначально болезнь получила неофициальное название "болезни четырех Г" - так как была обнаружена у жителей или гостей Гаити, употреблявших героин. Схожими симптомами обладают два вируса иммунодефицита, которыми болеют два вида африканских обезьян: обыкновенные шимпанзе и дымчатые мангобеи. Вполне возможно, что вирус мутировал и преодолел межвидовой барьер.

- ▣ Ученые доказали, что ВИЧ образовался в Западно-Центральной Африке в конце девятнадцатого или в начале двадцатого века. СПИД был впервые описан Центрами по контролю и профилактике заболеваний США в 1981 году, а его возбудитель, ВИЧ, был описан в начале 1980-х.

- До настоящего времени не создано вакцины против ВИЧ, лечение ВИЧ-инфекции значительно замедляет течение болезни, однако известен только единичный случай полного излечения болезни в результате пересадки модифицированных стволовых клеток. Интересно, что за тридцать с лишним лет с того момента, как ученые открыли этот вирус, у некоторых наблюдаемых больных признаки и симптомы ВИЧ (СПИДа) до сих пор не проявились.



□ В мире уже есть большое количество ученых, называемых СПИД-диссидентами, которые не разделяют навязываемую всему миру вирусную теорию смертельного СПИДа. Одним из доказательств их гипотезы является то что, обследованные жены 15 000 «ВИЧ-положительных» американцев почему-то не заразились вирусом, продолжая жить половой жизнью со своими мужьями.




- По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу с 1996 по 2009 год мировые расходы на борьбу с этой болезнью возросли с \$300 млн до \$15,9 млрд в год.




■ Африка к югу от Сахары остаётся наиболее затронутым регионом: здесь проживает 67 % всех людей, живущих с ВИЧ, и зарегистрирован 91 % всех новых случаев инфекции среди детей. В результате эпидемии более 14 миллионов детей в Африке к югу от Сахары стали сиротами. Эпидемия ВИЧ-инфекции привела к резкому снижению средней продолжительности жизни во многих африканских странах


Поширеність ВІЛ - інфекції серед вагітних у 2007 р.




Смертність від СНІД у 2007 р.
на 100 тис. населення



Поширеність СНІД за даними диспансерного обліку на 01.01.2008
на 100 тис. населення



Поширеність ВІЛ за даними диспансерного обліку на 01.01.2008
на 100 тис. населення



Різниця між ВІЛ і СНІД.

- Образець текста
 - Второй уровень
 - Третий уровень
 - Четвертый уровень
 - Пятый уровень

- СНІД є синдромом. Іншими словами, це сполучення захворювань та симптомів. Людина, заражена ВІЛ, може прожити довгі роки, перш ніж цей вірус призведе до СНІДу. Ця схема ілюструє різницю між ВІЛ і СНІД. **В даний час не існує можливості лікування від СНІДу.**



- Передача ВИЧ может происходить при сексе, переливании крови, использовании зараженных игл и шприцев; между матерью и ребёнком во время беременности, родов или при грудном вскармливании.

ВІЛ/СНІД. ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ КОЖНОМУ!

ЗНАННЯ – НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСТ ВІД СНІДУ!

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини. **СНІД** – синдром набутого імунодефіциту.

Це інфекційне захворювання, яке викликане ВІЛ та руйнує клітини захисної (імунної) системи організму людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі зареєстровано понад 50 млн. людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією. З них щороку помирає 3 млн. і ще 5 млн. стають носіями хвороби. В Україні носіями ВІЛ-інфекції є понад 150 тис. людей.

ЩО ПОВИННО НАСТОРОЖИТИ?

- прогресуюча втрата ваги (при незмінному харчуванні);
- пітливість, неочікувана втома, тривалі проноси;
- незначне підвищення температури тіла понад 1 місяць без будь-якої причини;
- збільшення лімфатичних вузлів на шиї, в пахах, під пахвами.

Знайте, що хвороба може себе не проявляти від 5-ти до 10-ти років!

ХТО МОЖЕ БУТИ ІНФІКОВАНИМ?

Жінка чи чоловік, незалежно від того скільки тобі років, де живеш, з ким спілкуєшся, ти не захищений від ВІЛ-інфекції. Кожен може заразитися. Але ти можеш і повинен захистити себе та інших від ВІЛ-інфекції. Для цього потрібно дотримуватись правил безпечної поведінки.

ЯК ВБЕРЕГТИ СЕБЕ ВІД ВІЛ/СНІДУ?

Уникати ситуацій, які несуть можливість інфікування, а саме:

- відмовитись від нерозбірливих статевих зв'язків з багаторазовою зміною партнерів;
- використання тільки стерильних одноразових шприців, голок, медичного інструментарію;
- в побуті відмовитись від користування чужими предметами особистої гігієни (зубні щітки, бритви, манікюрні набори);
- обов'язково користуватись якісними презервативами;
- не вживати наркотики та алкоголь. Вони збільшують ймовірність ризикованої поведінки.

Не можна ігнорувати проблемою ВІЛ і вважати, що вона нас не торкнеться.

ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ?

- при використанні нестерильних шприців, голок (після ін'єкцій, пірсингу, татуювання);
- при користуванні нестерильним медичним інструментарієм;
- переливання неперевіреної на ВІЛ-інфекцію крові;
- при статевих контактах з ВІЛ-інфікованою людиною без використання презервативів;
- від інфікованої матері до дитини під час вагітності та материнське молоко;
- передається вірус через кров, сперму, піхвові виділення, грудне молоко.

ВІЛ/СНІД НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ:

- повітряно-крапельним шляхом (чхання, кашель, перебування в одному приміщенні);
- через укуси комах, домашніх тварин;
- спільне користування з ВІЛ-інфікованою людиною посудом, постільною білизною, рушником, ванною, басейном, туалетом, телефоном, комп'ютером, спортивним та гімнастичним інвентарем;
- поцілунок, піт, слюзи, потиск руки, споживання їжі, ложки, виделки, ножі.



- В СССР первый случай СПИДа был зарегистрирован в 1982 году у ВИЧ-инфицированной девочки и ее матери, которая в 1978 году была невестой студента из Африки (тот через несколько лет умер от СПИДа).



- Отсутствие антиретровирусной терапии средняя продолжительность жизни с ВИЧ-инфекцией составляет от девяти до десяти лет, средняя продолжительность жизни на стадии СПИД составляет около девяти месяцев.

- ❑ Вирусы СПИДа при кипячении погибают через 1 мин, но при этом стойки к солнечным лучам и замораживанию.



- На сегодня вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — самый изучаемый из всех вирусов. О ВИЧ опубликовано более 200 тыс. научных статей.

- ▣ За заражение другого человека ВИЧ-инфекцией или поставление его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией в значительном числе государств предусматривается уголовная ответственность.

- В Киеве, возле Киево-Печерской Лавры, в Канадской провинции Квебек и столице Латвии Риге были установлены памятники жертвам СПИДа.



- Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Впервые он был провозглашён ВОЗ в 1988 году.

