Болезни желез внутренней секреции

Патология гипофиза

Заболевания гипофиза

- Гипофиз анатомически состоит из передней (аденогипофиз) и задней (нейрогипофиз) доли.
- Аденогипофиз состоит из эозинофильных клеток (пролактин, СТГ), базофильных клеток (АКТГ, ТТГ, МСГ), хромофобных клеток (ФСГ, ЛГ)

Гипофиз

Патогенез аденом гипофиза

- Развитие аденом гипофиза связано с мутацией гена *GNAS1*, локализованного в хромосоме 20q13, кодирующего белок $G_s \alpha$, относящегося к семейству белков сигнальной трансдукции G (гуанидин нуклеотид-связанных белков). Эта мутация приводит к постоянной генерации цАМФ и нерегулируемой пролиферации клеток. Реже аденомы гипофиза связаны с мутациями гена МЭН-1 типа (менина).

Аденома гипофиза

BITEMPORAL HEMIANOPSIA

Эозинофильная аденома

- Прولاктинома

Наиболее частая форма аденом.

Гиперпролактинемия характеризуется: аменореей, галактореей, утратой либидо и бесплодием.

Соматотрофная аденома

Соматотрофная аденома

- Проявления: гигантизм и акромегалия
- Признаки акромегалии:
- Увеличение надбровных дуг, нижней челюсти (прогнатизм), расширение межзубных промежутков (диастема), макроглоссия, укрупнение стоп и кистей, гиперплазия желез внутренней секреции, висцеромегалия, артериальная гипертензия, сахарный диабет, сердечная недостаточность

Лицо больного с акромегалией

Гиперпродукция АКТГ

- **Причины:** аденома или гиперплазия базофильных клеток аденогипофиза.
- **Признаки:** прогрессирующее ожирение по верхнему типу, лунообразное лицо, гипертрихоз, гирсутизм, стрии на коже живота и бедер, артериальная гипертензия, сахарный диабет, остеопороз и гиперкальцемия, камни в почках

Патогенез синдрома Кушинга

Гипопитуитаризм

- Причины: недоразвитие, кровоизлияния, некроз, инфаркт гипофиза. Нейроинфекции, опухоли
- Проявления:
- Гипофизарный нанизм (дwarfизм, карликовость)
- Церебрально-гипофизарное истощение (кахексия) (болезнь Симмондса-Шихана)
- Адипозо-генитальный синдром (нейроинфекция, опухоль гипоталамо-гипофизарной области): ожирение, гипогонадизм, гипотиреоз, надпочечниковая недостаточность, слабоумие

Поражение задней доли гипофиза

- **Несахарный диабет –**
недостаточность выработки АДГ
- **Причины: опухоли, нейроинфекции,**
травмы гипоталамо-диэнцефальной
зоны
- **Проявления: полиурия, подипсия,**
обезвоживание и электролитные
нарушения

Патология надпочечников

Надпочечники

Надпочечники

- **Корковое вещество:**
- **Клубочковая зона – альдостерон (увеличение реабсорбции натрия и хлора, секреции калия, увеличение осмолярности крови, задержка воды в организме)**
- **Пучковая зона – кортикостероиды (увеличение глюконеогенеза, увеличение катаболизма белка, усиление синтеза липидов, вымывание кальция из депо, снижение активности и апоптоз лимфоцитов и нейтрофилов)**
- **Сетчатая зона – андрогены и прогестины**
- **Мозговое вещество – катехоламины**

Надпочечниковая недостаточность

- Причины: некроз, кровоизлияния, метастазы опухоли, туберкулез, амилоидоз, супраренит, гипопитуитаризм
- Проявления: меланодермия (при первичной недостаточности), истощение, гипотония, гиперплазия лимфоидной ткани, гиперплазия островков Лангерганса (гипогликемия)

Надпочечниковая недостаточность

Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis

Лицо, больного болезнью Аддисона

Сравнительная характеристика надпочечников в норме, при болезни Аддисона и Кушинга

Кортикостерома

- Аденома из пучковой зоны
- Синдром Иценко-Кушинга – ожирение, стрии, артериальные гипертензии, нарушение толерантности к глюкозе, иммунодефицит, склонность к вторичным инфекциям, остеопороз, камни почек, гипокалиемия

Аденома коры надпочечника

Лицо больной с синдромом Кушинга

Патогенез синдрома Кона

Проявления синдрома Кона

- Артериальная гипертензия, гипокалиемия, мышечная слабость, сердечная недостаточность, аритмии, алкалоз

Феохромоцитома

Проявления феохромоцитомы

- Артериальная гипертензия, гипертонические кризы, сердечная недостаточность, ОНМК, аритмии. Нарушение толерантности к глюкозе

Сахарный диабет

Сахарный диабет – группа метаболических заболеваний, сопровождающиеся гипергликемией. Гипергликемия при диабете – результат нарушения синтеза, секреции или действия инсулина на клетки. Хроническая гипергликемия приводит к повреждению внутренних органов.

Регуляция синтеза инсулина

Обмен глюкозы и инсулина

Патогенез сахарного диабета первого типа

- Патогенез первого типа СД
- Это аутоиммунное заболевание с разрушением островковых клеток Т-лимфоцитами. Повреждение развивается по типу ГЗТ, реже через антитело-связанную цитотоксичность. Развивается абсолютная недостаточность инсулина, склонность к кетоацидозу. Имеется наследственная предрасположенность, ассоциированная с локусами (HLA-D). Роль вирусной инфекции как запускающего механизма повреждения островков.

Патогенез сахарного диабета второго типа

- 1. Уменьшение чувствительности периферических тканей к инсулину (инсулинорезистентность).
- 2. Неадекватная секреция инсулина вследствие *β -клеточной дисфункции*.
- Связь ожирения и сахарного диабета:
- Внутриклеточное накопление триглицеридов и свободных жирных кислот в тканях при ожирении подавляют восприимчивость клеток к инсулину.
- Повышение уровня гормонов жировой клетчатки (резистин), подавляющих активность инсулина.

Причины вторичного сахарного диабета

- **Заболевания поджелудочной железы:** хронический панкреатит, кистозный фиброз, гемахроматоз, опухоли, панкреатэктомия
- **Эндокринопатии:** Акромегалия, синдром Кушинга, тиреотоксикоз, феохромоцитома, глюкагонома
- **Лекарственные препараты:** глюкокортикоиды, гормоны щитовидной железы, α -интерферон, ингибиторы протеаз, β -адрерномиметики, тиазидные диуретики, никотиновая кислота, фенитоин

Нормальный островок Лангерганса и изменения в островках при сахарном диабете

- Патогенез осложнений диабета:
- Неферментативное гликозилирование
- Эффекты конечных продуктов гликозилирования: стимуляция выброса цитокинов и факторов роста макрофагами, увеличение проницаемости сосудов, увеличение прокоагулянтной активности эндотелия, активация синтеза коллагена фибробластами и миофибробластами.
- Внутриклеточная гипергликемия и активация полиольного пути.
- Активация протеинкиназы C под действием внутриклеточного диацилглицерола. Активация неоангиогенеза, фибриллогенеза.

Модификация белков при сахарном диабете

Патогенез основных проявлений сахарного диабета

- Причины кетоацидоза: дефицит инсулина приводит к активации липопротеид липазы и увеличению уровня свободных жирных кислот. В результате окисления последних образуются кетоны (энергетический субстрат при отсутствии глюкозы).
- Гиперосмолярная некетоацидотическая кома (повышенный диурез при недостаточном потреблении жидкости, дегидратация).

Осложнения сахарного диабета

**Диабетическая макроангиопатия:
Артериолосклероз**

**Диабетическая микроангиопатия
– диффузное утолщение
базальных мембран капилляров.**

**Диабетическая нефропатия –
утолщение базальных мембран
капилляров, канальцев почек,
диффузный и нодулярный
мезангиальный склероз.**

**Папиллярный некроз (папиллит) и
пиелонефрит.**

**Диабетическая нейропатия –
повреждение различных групп
периферических нервов.**

Диабетический гломерулосклероз

Диабетическая ретинопатия

- **Ретинопатия:**
- непролиферативная (кровоизлияния, микроинфаркты, сосудистые аневризмы, отек, микроангиопатия)
- пролиферативная (неоваскуляризация и фиброз).

Нормальная сетчатка и диабетическая ретинопатия

Pancreatic Islet Tumours

Fig.23-8

Инсулома

Гиперпаратиреоз

- Гиперпаратиреоидная остеодистрофия (von Recklinghausen болезнь): субпериостальная резорбция костной ткани, истончение коркового вещества кости, расширение костно-мозговых каналов. Резорбтивные процессы индуцирует остеобласты с формированием вокруг этих очагов фиброзной ткани. Микротрещины в костях приводят к кровоизлияниям и развитию грануляционной ткани, получившей название «коричневой» опухоли. Осложнения: переломы, деформации костей, суставные боли.

Гиперпаратиреоз

Hyperparathyroidism, Osteitis Fibrosa Cystica

Hyperparathyroidism, Large Area of Bone Destruction and Loss of Lamina Dura

Гиперпаратиреоз

Патология щитовидной железы

Щитовидная железа

Классификация зобов

- Зоб – патологическое увеличение щитовидной железы
- Формы:
 - Диффузный, узловой. Смешанный
 - Коллоидный (макрофолликулярный, микрофолликулярный, смешанный). Паренхиматозный
 - Эпидемический и спорадический
 - Эутиреоидный, гипертиреоидный (токсический), гипотиреоидный

Узловой коллоидный зоб

Узловой коллоидный зоб

- Тиреотоксикоз – состояние связанное с повышенным уровнем свободных Т3 и Т4.
- Причины:
 - Первичный – диффузный токсический зоб, гиперфункциональный (токсический) многоузловой зоб, токсическая аденома
 - Вторичный – ТСГ-секретирующая аденома гипофиза

Диффузный токсический зоб

- Причины: образование антител к рецепторам тиреоцитов к ТТГ, генетическая предрасположенность
- Проявления и осложнения:
- Повышенная возбудимость, гипертермия. Непереносимость жары. Повышенная потливость. Тремор. Мышечная слабость. Гипертрофия миокарда и миокардиодистрофия, кардиосклероз, аритмии. Стеатоз печени, тиреотоксический цирроз, гиперплазия тимуса, атрофия коры надпочечников. Офтальмопатия. Дерматопатия. Истощение. Гипергликемия

Лицо больной с тиреотоксикозом

Тиреотоксический зоб

Тиреоидиты

- Острые инфекционные
- Подострый гранулематозный
- Хронический аутоиммунный тиреоидит
Хашимото, фиброзирующий тиреоидит
Риделя

Тиреоидит Хашимото

- Тиреоидит Хашимото – одна из частых причин гипотиреоза. В основе лежит аутоиммунное повреждение щитовидной железы. Преобладают больные в возрасте 45-65 лет, преимущественно женщины.
- Патогенез: активация TCD4+ тиреоидными антигенами, выброс гамма-интерферона и активация макрофагов (гиперчувствительность замедленного типа), прямой цитолиз активированными TCD8+, образование антитиреоидных антител с последующей антительной цитотоксичностью и действием NK клеток.

Тиреоидит Хашимото

Признаки гипотиреоза

- **Причины:** тиреоидиты, дефицит йода, тиреоидэктомия, облучение, гипопитуитаризм, антитиреоидные препараты
- **Проявления:** снижение основного обмена, сонливость, медлительность, заторможенность, апатия, запоры, гиперкератоз, мукоидный отек кожи и стромы органов (микседема), склонность к ожирению. характерные изменений лица – одутловатость, огрубленные черт, алопеция. Увеличение в размерах языка, глухой голос. гиперхолестеринемия, прогрессирующий атеросклероз.

Лицо больной с микседемой

Опухоли щитовидной железы

- Аденомы: фолликулярные, С-клеточные, онкоцитарные, токсические
- Раки : папиллярный, фолликулярный, С-клеточный

Фолликулярная аденома

Генетические основы токсических аденом щитовидной железы

Мутации гена, кодирующего рецептор к ТТГ
(TSH) или Gs (gsp) белку

Хроническая активация аденилатциклазы и
цАМФ

Активация TTF-1 и тиреоид-
ассоциированных генов

Папиллярный рак щитовидной железы

Особенности «папиллярного» пути канцерогенеза

- Нет доброкачественного аналога
- Развивается путем одной ключевой мутации
- Связь с перестройкой гена RET
- Выраженные изменения ядерной мембраны, хроматина (с начальных стадий опухоли)
- Связь с воздействием радиации

Особенности «фолликулярного» пути канцерогенеза

- ❖ Ступенчатая трансформация опухоли от аденомы к раку
- ❖ Ключевая ступень малигнизации – появление инвазивных свойств
- ❖ Перестройка ядер и хроматина слабо выражена