

Тип Плоские черви

Тип Плоские
черви

```
graph TD; A["Тип Плоские  
черви"] --> B["Класс  
Ресничные  
черви"]; A --> C["Класс  
Сосальщнки"]; A --> D["Класс  
Ленточные  
черви"];
```

Класс
Ресничные
черви

Класс
Сосальщнки

Класс
Ленточные
черви

Плоские черви

К типу плоских червей относят трехслойных двусторонне-симметричных животных. Стенка их тела образована из производных трех слоев: экто-, энто- и мезодермы.

В настоящее время известно более 12,5 тыс. видов плоских червей.

Они объединены в несколько **классов**, из которых наиболее известны три:

Ресничные, Сосальщики и Ленточные.

Последние два класса в процессе эволюции перешли к паразитизму и значительно отличаются по особенностям организации от свободноживущих ресничных червей. Они, в особенности ленточные черви, утратили ряд органов и систем, позволяющих существовать вне организма-хозяина.



Ксенотурбеллида (Xenoturbella bocki).

Строение плоских червей

У всех плоских червей тело вытянуто и уплощено в спиннобрюшном направлении. Отчетливо выделены передний и задний концы. Многие свободноживущие черви на переднем конце имеют щупальцевидные выросты, несущие органы чувств. Ленточные черви и сосальщики-паразиты, они имеют различные приспособления для прикрепления к телу хозяина: присоски или крючья. **Размеры плоских червей колеблются от 0,5 мм до 50-70 см(у свободноживущих форм) и даже 30 м (у паразитов).**

Трёхслойные:

энтодерма образовала кишечник, а эктодерма с мезодермой (третьим внутренним слоем)- кожно-мускульный мешок, полости тела нет, промежутки между органами заполнены рыхлой соединительной тканью- паренхимой.

Нервная система

Нервная система представлена нервными узлами, расположенными на переднем конце тела, - мозговыми ганглиями и отходящими от них нервными стволами, соединенными перемычками («лестница»)



Органы чувств

Органы чувств, представлены отдельными кожными ресничками-отростками чувствительных нервных клеток. Некоторые свободноживущие представители типа в процессе приспособления к условиям существования, требующим большого разнообразия движений, приобрели примитивные органы зрения - светочувствительные пигментные глазки и органы чувств.

Пищеварительная система

*Пищеварительная система есть не у всех ведущих паразитический образ жизни плоских червей. У свободноживущих ресничных и паразитических сосальщиков пищеварительная трубка представлена мускулистой глоткой, открывающейся наружу **ротовым отверстием**, часто в центре брюшной стороны тела, **и кишкой**. Она выстлана железистым эпителием, разветвлена и замкнута. **Заднепроходного отверстия нет, непереваренные остатки пищи удаляются через рот.***

Выделительная система

*Выделительная система
представлена системой
разветвленных канальцев -
протонефридии,*

*заканчивающихся в паренхиме
звездчатыми клетками с пучком
ресничек. Канальцы сообщаются с
внешней средой
**выделительными
отверстиями.***

***Дыхательной и кровеносной
систем нет.***

Дышат всей поверхностью тела.

Половая система

Плоские черви –гермафродиты; половая система состоит из половых желез –семенников и яичников – и сложной системы протоков, служащих для выведения половых клеток. Некоторые группы плоских червей приобрели прогрессивные приспособления для внутреннего оплодотворения.

Класс Ресничные черви

Длина ресничных червей от **долей мм до 60 см**.

Листовидное тело покрыто ресничным эпителием и лишено каких бы то ни было придатков. На головном конце тела расположены разнообразные органы чувств.


Большинство видов ярко окрашены, благодаря зернам залегающего в коже пигмента.



Турбеллярия вида
Pseudoceros ferrugineus.

**В отличие от
сосальщиков и
ленточных червей, у
ресничных нет
специализированных
органов прикрепления.**

**Движение
осуществляется как с
помощью ресничек, так
и в результате
сокращения
мускулатуры. При этом,
ресничные черви
способны не только
ползать по субстрату,
но и плавать.**



**Архоофора
Thysanozoon
nigropapillosum.**

Пищеварительная система ресничных

Пищеварительная система ресничных червей представлена глоткой с отходящим от нее слепозамкнутым кишечником. У мелких видов он имеет вид мешка, у крупных — разделяется не менее чем на три ветви; реже кишечник отсутствует. Нередко глотка способна выворачиваться наружу, что позволяет турбелляриям захватывать и удерживать довольно крупную добычу.

Ресничные черви — гермафродиты, однако оплодотворение у них, чаще всего, перекрестное. Развитие происходит с метаморфозом. Около 3500 видов, большинство из которых свободноживущие морские и пресноводные животные, реже наземные или эктопаразиты. Очень богатая фауна ресничных червей характерна для оз. Байкал, где обитает более 30 эндемичных видов. Часто используются в качестве лабораторных животных, способных к образованию простейших условных рефлексов.



Большинство ресничных червей — свободноплавающие морские животные. Данный экземпляр с острова Фиджи достигает 2 см в длину.

**Турбеллярия
вида *Vipalium
kewense*.**



Класс сосальщики

Тело сосальщиков, чаще всего, листовидное, от неск. мм до 1,5 м. В отличие от ресничных покровы сосальщиков полностью лишены ресничного эпителия. Органы прикрепления представлены двумя присосками, одна из которых окружает ротовое отверстие, а вторая расположена на брюшной стороне в верхней трети тела. Ранее полагали, что сосальщики имеют два рта. Это послужило причиной второго названия — двуустки, которое используется и в настоящее время. Существует около 4 тыс. видов, разделяющихся на два подкласса: дигенетические сосальщики и аспидогастры.

Пищеварительная система сосальщиков

Плотные покровы сосальщиков защищают их от действия ферментов хозяина.

Пищеварительная система представлена глоткой, от которой отходит двуветвистый, слепозамкнутый кишечник. У некоторых видов каждая из его ветвей образует многочисленные слепые отростки. Иногда кишечник редуцируется, и в этом случае всасывание пищи происходит через покровы.

Половая система сосальщиков

Половая система сосальщиков гермафродитна, что является приспособлением к эндопаразитизму.

Оплодотворение, как правило, перекрестное. В редких случаях наблюдается вторичная раздельнополость (напр., у кровяной двуустки). В женской половой системе развивается особый орган — матка, в которой созревают яйца.

Развитие сосальщиков происходит со сменой хозяев, чередованием поколений и сменой паразитических и свободноживущих фаз развития. Взрослые сосальщики паразитируют в теле позвоночных животных и человека, вызывая трематодозы; партеногенетические поколения развиваются в брюхоногих моллюсках, реже в — членистоногих.

Сосальщики отличаются огромной плодовитостью. Самка печеночной двуустки способна продуцировать до 20 тыс. яиц в сутки. Кроме того, каждая выходящая из яиц личинка дает начало многочисленным партеногенетическим особям. Это во много раз увеличивает численность паразита, компенсируя повышенную смертность яиц и личинок при их случайной передаче от одного хозяина к другому.

Моногенеи на Атлантическом лососе.





Класс Ленточные черви

Существует более 3000 видов, разделяющихся на 3 отряда, в т. ч. гвоздичные и цепни.

Длина ленточных червей от неск. долей мм до 30 м. Лентовидное тело (отсюда название) обычно поделено на многочисленные (до нескольких тысяч) членики; реже их количество не превышает 2-3 (напр., у эхинококка), или тело вовсе нечленистое (напр., у ремнецов). **На переднем конце тела имеется небольшая головка — сколекс**, на которой часто развиваются органы прикрепления: присоски или хитиновые крючья.

За сколексом расположена узкая шейка, которая представляет собой зону роста. От нее постоянно отшнуровываются новые членики. В связи с эндопаразитическим образом жизни у ленточных червей полностью редуцирован кишечник. Всасывание пищи у них происходит всей поверхностью тела, благодаря микроскопическим выростам покровов — микротрихиям. Дыхание ленточных червей анаэробное и происходит в результате расщепления гликогена.



Половая система ленточных

Лучше других у ленточных червей развита половая система. Она гермафродитна и повторяется в каждом членике тела. Чем дальше от головки располагаются членики, тем более зрелыми они являются. Если в передней части тела червя членики содержат недоразвитые мужскую и женскую половые системы, то в задней части в них остается только заполненная яйцами матка.

Зрелые членики отрываются от тела червя и выносятся с фекалиями во внешнюю среду.

Плодовитость ленточных червей чрезвычайно велика и может достигать 600 млн. яиц в год. Если учесть, что некоторые черви способны жить около 20 лет, общее количество отложенных ими яиц составит около 11 млрд. У мелких видов ленточных червей наблюдается перекрестное оплодотворение между разными особями, тогда как у крупных происходит перекрестное оплодотворение между разными члениками тела. Реже наблюдается самооплодотворение.

Жизненные циклы ленточных червей

Жизненные циклы ленточных червей происходят в несколько этапов. На первом — взрослые черви, обитающие в тканях или органах основного хозяина, размножаются и продуцируют яйца. На втором — яйца попадают во внешнюю среду (почву или воду) и в них формируется личинка — онкосфера. Затем происходит попадание личинки в организм промежуточного хозяина. В результате внедрения в стенку кишечника, она попадает в кровяное русло и разносится током крови в различные органы. Здесь она превращается в покоящуюся стадию — пузырчатую глисту, или финну. Для дальнейшего развития она должна попасть в организм основного хозяина. В его кишечнике под действием пищеварительных соков из финны выворачивается головка и паразит прикрепляется к стенке кишечника.



Сколекс крысиного цепня (*Hymenolepis diminuta*). Вид гельминтов класса цестод. Окончательные хозяева — крысы и мыши, промежуточные — насекомые. Паразитирует в тонкой кишке.

Ленточные черви (взрослые и личинки) паразитируют в кишечнике и других органах животных и человека, вызывая заболевания — цестодозы. Наиболее опасными для человека являются широкий лентец, свиной и бычий солитеры, а также эхинококк и альвеококк.

Сколекс свиного солитера, или, как его еще называют, вооруженного цепня (Taenia solium).



Домашнее задание

Параграф 14-15