

Неопределённый интеграл

Содержание

1. Первообразная и неопределённый интеграл
2. Основные свойства неопределённого интеграла
3. Таблица интегралов
4. Методы интегрирования:
 - непосредственное интегрирование;
 - метод замены переменной;
 - интегрирование по частям

Первообразная и неопределённый интеграл

Функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$ в промежутке $a \leq x \leq b$, если в любой точке этого промежутка её производная равна $f(x)$:

$$F'(x) = f(x) \Rightarrow dF(x) = f(x)dx, \quad a \leq x \leq b.$$

Отыскание первообразной функции по заданной её производной $f(x)$ или по дифференциалу $f(x)dx$ есть действие, обратное дифференцированию, - интегрирование.

Совокупность первообразных для функции $f(x)$ или для дифференциала $f(x)dx$ называется неопределённым интегралом и обозначается символом $\int f(x)dx$.

Таким образом,

$$\int f(x)dx = F(x) + C, \quad \text{если} \quad d[F(x) + C] = f(x)dx.$$

Здесь, $f(x)$ - подынтегральная функция, $f(x)dx$ - подынтегральное выражение, C – произвольная постоянная.

Основные свойства неопределённого интеграла

1. Неопределённый интеграл от дифференциала функции равен этой функции плюс произвольная постоянная:

$$\int dF(x) = F(x) + C.$$

2. Дифференциал неопределённого интеграла равен подынтегральному выражению, а производная неопределённого интеграла равна подынтегральной функции:

$$d \int f(x) dx = f(x) dx, \quad \left(\int f(x) dx \right)' = f(x).$$

3. Неопределённый интеграл алгебраической суммы функций равен алгебраической сумме неопределённых интегралов этих функций:

$$\int [f(x) + \varphi(x)] dx = \int f(x) dx + \int \varphi(x) dx.$$

4. Постоянный множитель подынтегрального выражения можно выносить за знак неопределённого интеграла:

$$\int af(x) dx = a \int f(x) dx.$$

5. Если $\int f(x) dx = F(x) + C$ и $u = \varphi(x)$ — любая известная функция, имеющая непрерывную производную, то

$$\int f(u) du = F(u) + C.$$

Таблица интегралов

$$1. \int dx = x + C;$$

$$2. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1);$$

$$3. \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C;$$

$$4. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C;$$

$$5. \int e^x dx = e^x + C;$$

$$6. \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$7. \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$8. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C;$$

$$9. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$10. \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$$

$$11. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C;$$

$$12. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$13. \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

Непосредственное интегрирование

Непосредственное интегрирование основано на прямом использовании таблицы интегралов. Здесь могут представиться следующие случаи:

1. данный интеграл находится непосредственно по соответствующему табличному интегралу;
2. данный интеграл после применения свойств 3) и 4) приводится к одному или нескольким табличным интегралам;
3. данный интеграл после элементарных тождественных преобразований над подынтегральной функцией и применения свойств 3) и 4) приводится к одному или нескольким табличным интегралам.

Непосредственное интегрирование

Найдите следующие интегралы:

1) $\int 5 dx$.

Решение:

На основании свойства 4) постоянный множитель 5 можно вынести за знак интеграла и, используя формулу 1, получим:

$$\int 5 dx = 5 \int dx = 5x + C.$$

2) $\int 6x^2 dx$.

Решение:

Используя свойство 4) и формулу 2, получим:

$$\int 6x^2 dx = 6 \int x^2 dx = 6 \cdot \frac{x^{2+1}}{2+1} + C = 2x^3 + C.$$

3) $\int 4(x^2 - x + 3) dx$.

Решение:

Используя свойства 3) и 4) и формулы 2 и 1, имеем:

$$\int 4(x^2 - x + 3) dx = 4 \int x^2 dx - 4 \int x dx + 12 \int dx = 4 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 12x + C = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + 12x + C.$$

Постоянная интегрирования C равна алгебраической сумме трёх постоянных интегрирования, так как каждый интеграл имеет свою произвольную постоянную ($C_1 + C_2 + C_3 = C$)

Непосредственное интегрирование

Найдите следующие интегралы:

$$4) \int 2(3x-1)^2 dx.$$

Решение:

$$\int 2(3x-1)^2 dx = \int (18x^2 - 12x + 2) dx = 18 \int x^2 dx - 12 \int x dx + 2 \int dx = 6x^3 - 6x^2 + 2x + C.$$

$$5) \int \frac{x^3 + 3x^2 + 4x}{x} dx.$$

Решение:

$$\int \frac{x^3 + 3x^2 + 4x}{x} dx = \int (x^2 + 3x + 4) dx = \int x^2 dx + 3 \int x dx + 4 \int dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 4x + C.$$

Задачи для самостоятельной работы:

$$1. \int 4x^3 dx; \quad 2. \int (2x-1)^3 dx; \quad 3. \int \frac{x^2 - x}{3x} dx.$$

Метод замены переменной

Сущность интегрирования методом замены переменной (способом подстановки) заключается в преобразовании интеграла $\int f(x)dx$ в интеграл $\int F(u)du$, который легко вычисляется по какой-либо из основных формул интегрирования.

Для нахождения интеграла $\int f(x)dx$ заменяем переменную x новой переменной u с помощью подстановки $x = \varphi(u)$. Дифференцируя это равенство, получим $dx = \varphi'(u)du$. Подставляя в подынтегральное выражение вместо x и dx их значения, выраженные через u и du , имеем

$$\int f(x)dx = \int f[\varphi(u)]\varphi'(u)du = \int F(u)du.$$

После того как интеграл относительно новой переменной u будет найден, с помощью подстановки $u = \psi(x)$ он приводится к переменной x .

Метод замены переменной

Найдите следующие интегралы:

$$1) \int (3x + 2)^5 dx .$$

Решение:

Введём подстановку $3x + 2 = u$. Дифференцируя, имеем $3dx = du$,
откуда $dx = \frac{1}{3} du$. Подставив в данный интеграл вместо $3x + 2$ u и dx
их выражения, получим:

$$\int (3x + 2)^5 dx = \frac{1}{3} \int u^5 du = \frac{1}{3} \cdot \frac{u^6}{6} + C = \frac{1}{18} u^6 + C.$$

Заменяя u его выражением через x , находим:

$$\int (3x + 2)^5 dx = \frac{1}{18} u^6 + C = \frac{1}{18} (3x + 2)^6 + C.$$

Метод замены переменной

Найдите следующие интегралы:

$$2) \int (2x^3 + 1)^4 x^2 dx .$$

Решение:

Введём подстановку $2x^3 + 1 = u$. Дифференцируя, имеем $6x^2 dx = du$,
откуда $x^2 dx = \frac{1}{6} du$. Таким образом,

$$\int (2x^3 + 1)^4 x^2 dx = \frac{1}{6} \int u^4 du = \frac{1}{6} \cdot \frac{u^5}{5} + C = \frac{1}{30} u^5 + C = \frac{1}{30} (2x^3 + 1)^5 + C.$$

$$3) \int \frac{x dx}{(x^2 + 1)^3} .$$

Решение:

Введём подстановку $x^2 + 1 = u$. Дифференцируя, имеем $2x dx = du$,
откуда $x dx = \frac{1}{2} du$. Таким образом,

$$\int \frac{x dx}{(x^2 + 1)^3} = \int (x^2 + 1)^{-3} x dx = \frac{1}{2} \int u^{-3} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{4u^2} + C = -\frac{1}{4(x^2 + 1)^2} + C.$$

Метод замены переменной

Найдите следующие интегралы:

$$4) \int \frac{x^2 dx}{5x^3 + 1}.$$

Решение:

Введём подстановку $5x^3 + 1 = u$. Дифференцируя, имеем $15x^2 dx = du$, откуда $x^2 dx = \frac{1}{15} du$. Таким образом,

$$\int \frac{x^2 dx}{5x^3 + 1} = \frac{1}{15} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{15} \ln u + C = \frac{1}{15} \ln |5x^3 + 1| + C.$$

Задачи для самостоятельной работы:

$$1. \int (7 - 2x)^3 dx; \quad 2. \int (x^2 + 3)^5 x dx; \quad 3. \int \frac{x^3 dx}{(5x^4 + 3)^5}.$$

Интегрирование по частям

Интегрируя обе части равенства $d(uv) = u dv + v du$, получим

$$\int d(uv) = \int u dv + \int v du; \quad uv = \int u dv + \int v du,$$

откуда

$$\int u dv = uv - \int v du. \quad (14)$$

С помощью этой формулы вычисление интеграла $\int u dv$ сводится к вычислению интеграла $\int v du$, если последний окажется проще исходного.

Интегрирование по частям

Найдите следующие интегралы:

1) $\int x \sin x \, dx$.

Решение:

Пусть $u = x$, $dv = \sin x \, dx$; тогда $du = dx$, $\int dv = \int \sin x \, dx$, т.е. $v = -\cos x$.

Используя формулу (14), получим:

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + C.$$

2) $\int \frac{\ln x \, dx}{x^2}$.

Решение:

Пусть $u = \ln x$, $dv = \frac{dx}{x^2}$; тогда $du = \frac{dx}{x}$, $\int dv = \int \frac{dx}{x^2} = \int x^{-2} \, dx = -\frac{1}{x}$; $v = -\frac{1}{x}$.

Используя формулу (14), получим:

$$\int \frac{\ln x \, dx}{x^2} = -\frac{\ln x}{x} + \int x^{-2} \, dx = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C.$$

Интегрирование по частям

Найдите следующий интеграл:

$$3) \int \sqrt{x^2 + a^2} dx.$$

Решение:

1. Пусть $u = \sqrt{x^2 + a^2}$, $dv = dx$; тогда $du = \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$, $v = x$.
По формуле (14) получим:

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = x\sqrt{x^2 + a^2} - \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}.$$

2. В числителе подынтегральной функции последнего интеграла прибавим и вычтем a^2 и представим этот интеграл в виде суммы двух интегралов:

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = x\sqrt{x^2 + a^2} - \int \frac{x^2 + a^2 - a^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = x\sqrt{x^2 + a^2} - \int \frac{x^2 + a^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx + a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}.$$

3. Последний интеграл находим по формуле (11):

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = x\sqrt{x^2 + a^2} - \int \sqrt{x^2 + a^2} dx + a^2 \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C.$$

Интегрирование по частям

4. Перенеся $\int \sqrt{x^2 + a^2} dx$ из правой части в левую, получим:

$$2 \int \sqrt{x^2 + a^2} dx = x\sqrt{x^2 + a^2} + a^2 \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C,$$

или окончательно

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} x\sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C.$$

Задачи для самостоятельной работы:

$$1) \int x \cos x dx; \quad 2) \int \frac{x dx}{\sin^2 x}; \quad 3) \int \sqrt{x^2 - a^2} dx.$$