



Профессиональные заболевания среди населения в ЧР.

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ ГРУППЫ УП-41-16
ПАВЛОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Профессиональное заболевание

это заболевание, развившееся в результате воздействия факторов риска, обусловленных трудовой деятельностью (определение Международной организации труда - МОТ).





Основные критерии, позволяющие определить профессиональное происхождение заболеваний, следующие:

- наличие связи с конкретным производственным фактором (например, пыль - пневмокониоз);
- наличие причинно-следственных связей с производственной средой и профессией;
- превышение среднего уровня заболеваемости у определенной профессиональной группы лиц по сравнению со всей когортой населения.



В основу классификации профессиональных заболеваний кладется:

- системный принцип
- этиологический принцип

Системный принцип

основан на преимущественном действии профессиональных вредностей на ту или иную систему организма (например, заболевания с преимущественным поражением органов дыхания, системы крови и т.д.).



Этиологический принцип

основан на воздействии различных групп повреждающих факторов - химических, промышленных аэрозолей, физических, связанных с перенапряжением и физическими перегрузками отдельных органов и систем и биологических.



Действующий в РФ список профессиональных заболеваний основан на этиологическом принципе и включает 150 заболеваний. Он состоит из трех разделов:

- Первый содержит наименование болезней в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ) ВОЗ IX пересмотра.
- Во втором разделе Списка приведены опасные, вредные вещества и производственные факторы, воздействие которых может вызывать конкретные указанные заболевания.
- Третий раздел содержит примерный перечень проводимых работ и производств, где могут возникать те или иные профессиональные заболевания.



В зависимости от сроков формирования профессиональных заболеваний их подразделяют на острые и хронические.

- *Острые профессиональные заболевания (отравления)*
- *Хронические профессиональные заболевания (отравления)*



Острые профессиональные заболевания (отравления)

заболевания, развившиеся внезапно, после однократного (в течение не более одной рабочей смены) воздействия вредных производственных факторов.



Хронические профессиональные заболевания (отравления)

заболевания, которые возникают в результате длительного воздействия вредных факторов.


Удельный вес численности работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (на конец года), % от общей численности работающих



Наиболее высокий удельный вес работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, зарегистрирован в

- г.Новочебоксарск
- г.Канаш
- Канашский район
- Порецкий район
- Вурнарский район
- Моргаушский район

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, в разрезе муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, %



Наибольший удельный вес численности работников, условия работы которых не отвечают гигиеническим нормативам условий труда, зарегистрирован в

- организациях производства транспортных средств и оборудования
- химического, металлургического производства и производства готовых металлических изделий
- в организациях по добыче полезных ископаемых, прочих неметаллических минеральных продуктов

Основными возможными причинами возникновения профзаболеваний являются

- несовершенство технологических процессов
- конструктивные недостатки машин и оборудования
- несовершенство санитарно-технических установок
- нарушение режима труда и отдыха



Заключение

Благодаря скоординированному взаимодействию органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере контроля и надзора, объединений работодателей и профсоюзов, а также реализации комплекса программно-целевых мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда, в республике сохраняется устойчивая тенденция снижения уровня профессиональной заболеваемости. За последние десять лет уровень профессиональной заболеваемости снизился в 1,5 раза.



Спасибо за внимание!