

Тема: «Применение производной к исследованию функции»

Применение производной к исследованию функции

1) промежутки возрастания,
убывания

2) точки экстремума и значение
функции в этих точках

3) наибольшее и наименьшее
значение функции

4) построение графика функции



Признак возрастания (убывания) функции

Достаточный признак возрастания функции.




Если $f'(x) > 0$ в каждой точке интервала I , то функция возрастает на I .

Достаточный признак убывания функции.

Если $f'(x) < 0$ в каждой I , то функция убывает на I .

Если $f'(x) = 0$ в каждой точке интервала I , то f является постоянной (константой) на интервале I .

Промежутки возрастания, убывания



↗ - функция возрастает,

↘ - функция убывает.

Пример: Найти промежутки
возрастания и убывания функции.

Построить график $f(x) = x^3 - 27x$



Решение:

Данная функция определена на множестве всех действительных чисел. Из равенства $f'(x) = 3x^2 - 27x$ следует, что $f' > 0$, если $3x^2 - 27 > 0$. Решаем это неравенство методом интервалов, получим:

$$3x^2 - 27 > 0,$$

$$3(x^2 - 9) > 0,$$

$$3(x - 3)(x + 3) > 0.$$



Получили, что $f' > 0$ на интервале $(-\infty; -3)$ и $(3; +\infty)$ и значит, на этих интервалах функция f возрастает.


Аналогично $f' < 0$ на интервале $(-3; 3)$, поэтому на этом интервале f убывает.

Вычисляем значение функции в точках -3 и 3.

$$f(-3) = (-3)^2 - 27 \cdot (-3) = -27 + 81 = 54;$$

$$f(3) = 27 - 81 = -54.$$

На координатной плоскости отметим точки $M(-3; 54)$ и $N(3; 54)$ и нарисуем проходящий через них график функции, возрастающей на интервалах $(-\infty; -3)$ и $(3; +\infty)$ и убывающей на интервале $(-3; 3)$.



Функция f , непрерывна в точке -3 и 3 , возрастает на промежутке $(-\infty; -3]$, $[3; +\infty)$ и убывает на отрезке $[-3; 3]$

Критические точки функции, максимума и минимума


Внутренние точки $D(f)$ функции, в которой ее производная равна нулю или не существует, называются **критическими точками** (только они могут быть точками экстремума).

Необходимое условие экстремума. Если точка x_0 является точкой экстремума функции f и в этой точке существует производная f' , то она равна нулю:
 $f'(x_0) = 0$.

Признаки максимума функции. Если функция f непрерывна в точке x_0 , а $f'(x) > 0$ на интервале (a, x_0) и $f'(x) < 0$ на интервале (x_0, b) , то точка x_0 является точкой максимума функции f . (Если в точке x_0 производная меняется знак с «+» на «-», то x_0 есть точка максимума)

Признак минимума функции. Если функция f непрерывна в точке x_0 , а $f'(x) < 0$ на интервале (a, x_0) и $f'(x) > 0$ на интервале (x_0, b) , то точка x_0 является точкой минимума функции f . (Если в точке x_0 производная меняется знак с «-» на «+», то x_0 есть точка минимума)

Точки экстремума и значение функции в этих точках



Пример: Найти критические точки функции.
Определить, какие из них являются точками
максимума,
а какие – точками минимума.

$$f(x) = 9 + 8x^2 - x^4$$



Решение:

$$f' = 16x - 4x^3;$$

$f'(x)$ определена во всех точках,


$$f' = 0,$$

$$16x - 4x^3 = 0,$$

$$4x(4 - x^2) = 0,$$

$$x=0 \text{ или } (2-x)(2+x)=0$$

$$x=0, x=-2, x=2.$$



В точке 0 производная меняет знак с «-» на «+» ($f'(x) < 0$ при $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; 0)$ и $f'(x) > 0$ при $x \in (0; 2) \cup (2; +\infty)$).

Пользуясь признаками максимума и минимума, получаем, что точка 0 является точкой минимума $f_{\min}(x) = f(0) = 9$.

Наибольшее и наименьшее значение функции

Чтобы найти наибольшее и наименьшее значения функции, имеющей на отрезке конечное число критических точек, нужно вычислить значение функции во всех критических точках и на концах отрезка, а затем из полученных чисел выбрать наибольшее и наименьшее значение функции.

Пример: Найти наибольшее и наименьшее значение функции $f(x) = x^4 - 8x^2 - 9$ на промежутках $[-1; 1]$ $[0; 3]$.

Решение:

Находим критические точки.

Т.к. производная $f' = 4x^3 - 16x$ определена для любого x . Остается решить уравнение $f'(x) = 0$.

$$4x^3 - 16x = 0,$$

$$4x(x^2 - 4) = 0,$$

$$x = 0 \text{ или } (x - 2)(x + 2) = 0,$$

$$x = 0, x = 2, x = -2.$$

Выбираем наибольшее и наименьшее из чисел

$$f(0) = -9, f(2) = -25, f(-1) = -16, f(1) = -16, f(3) = 0.$$

Критическая точка -2 не принадлежит указанным промежуткам. Наибольшее значение достигается в точке 3 и равно 0 , а наименьшее в точке 2 и равно -25 .

$$\max f(x) = f(3) = 0$$

$$[-1; 1] \text{ и } [0; 3]$$

$$\min f(x) = f(2) = -25$$

$$[-1; 1] \text{ и } [0; 3]$$

Применение исследования на наибольшее (наименьшее) значение функции к решению прикладных задач

Для этого:

1. Задача «переводится» на язык функции. Для этого выбирают удобный параметр x , через который интересующую нас величину выражают как функцию $f(x)$;
2. Средствами анализа находится наибольшее и наименьшее значение этой функции на некотором промежутке;
3. Выясняется, какой практический смысл (в терминах первоначальной задачи) имеет полученный (на языке функций) результат.

Пример: Кусок проволоки длиной 48 м
сгибается так, чтобы образовался
прямоугольник. Какую длину должны иметь
стороны прямоугольника, чтобы его площадь
принимала наибольшее значение



Решение:

1. Обозначим через x длину стороны прямоугольника, а вторая сторона равна $(24 - x)$. Тогда площадь равна $S(x) = x(24 - x)$. По смыслу задачи $0 < x < 24$, таким образом, мы свели поставленную задачу к следующей: найти наибольшее значение функции $S(x) = x(24 - x)$ на интервале $(0; 24)$.
2. Правило нахождения наименьших и наибольших значений функции было сформировано на отрезке. Функция $S(x)$ непрерывна на всей числовой прямой; мы будем искать ее наибольшее значение на отрезке $[0; 24]$, потом сделаем выводы для решаемой задачи. Находим критические точки функции:

$$S'(x) = 24 - 2x,$$

$$S'(x) = 0,$$

$$24 - 2x = 0,$$

$$x = 12,$$

$$S(12) = 12 \cdot (24 - 12) = 144.$$



Т.к. $S(0) = 0$ и $S(24) = 0$, своего наибольшего значения на отрезке $[0; 24]$ функция S достигает при $x = 12$, т.е. $\max S(x) = S(12) = 144$.

Наибольшее значение функции достигается внутри отрезка $[0; 24]$, а следовательно, и внутри интервала $(0; 24)$.

3. Вспомним что x — длина стороны прямоугольника, имеющей при заданных условиях максимально возможную площадь. Полученный результат означает, что максимальную площадь имеет коробка со стороной 12 см и 12 см, т.е. квадрат.

$$y = f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2$$

Практическое применение к исследованию функции

Пример: Исследовать функцию $y = f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2$ и построить ее график

Схема исследования:

1. Найти область определения
2. Выяснить, является функция четной или нечетной
3. Найти точки пересечения с осями
4. Найти промежутки возрастания, убывания
5. Найти точки экстремума и значение функции в этих точках
6. Построить график




$$y = f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2$$

Пример: Исследовать функцию $y=f(x)= 3x^5 - 5x^3 + 2$ и построить ее график.

Решение:

1. $D(y)=\mathbb{R}$
2. Функция ни четная, ни нечетная
3. Точки пересечения с осями: график $f(x)$ пересекается с осью ординат в точке $(0; 2)$. Найдем точки пересечения с осью абсцисс, для этого решим уравнение $3x^5 - 5x^3 + 2 = 0$, один из корней которого ($x=1$) легко находится. Другие корни (если они есть) могут быть найдены только приближенно. Поэтому для данной функции остальные точки пересечения графика с осью абсцисс находить не будем.
4. Промежутки монотонности: $f'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x^2-1)$



5. Точки экстремума и значение функции в этих точках:

$$x_{\max} = -1 \quad x_{\min} = 1 \quad f(-1) = 4 \quad f(1) = 0$$

6. Построить график

