


Мобильная зависимость



**Мобильная зависимость – это
состояние человека, при котором
телефон становится предметом
культы, человек бессознательно
совершает звонок ради самого
звонка, не осознавая своих
действий или неспособен
объяснить его причину.**



Ученые из Великобритании выделили три типа владельцев сотовых телефонов

- «Киборги» - считают телефон своим продолжением, чуть ли не частью тела, не могут без него обходиться.
- «Протезированные» - жить без «трубы» в принципе могут, но испытывают при этом дискомфорт.
- «Непривязанные» - для них телефон это просто телефон, не больше, чтобы звонить, когда действительно нужно.



Причины зависимости от
алкоголя, табака, сладостей - или
мобильного телефона -
одинаковые.




Мобильные телефоны влияют
на поведение и психику
человека.




Последствия мобильной зависимости

**Доказано, что если человек
разговаривает по сотовому
ежедневно более 45-60 минут,
то такому болтуну никуда не
скрыться от головной боли.**



Последствия мобильной зависимости

Пользователи сотовой связи
больше всех подвержены
сонливости, раздражительности,
эти люди чаще всех жалуются на
головные боли.




**Последствия мобильной
зависимости**
Под воздействием электромагнитных
полей, которые вырабатывает телефон,
организм подвержен напряжению
иммунной системы, что приводит к
болезням. Если вы пользуетесь
мобильным телефоном неограниченное
время, то знайте - ваш иммунитет под
угрозой.




Последствия мобильной зависимости

При использовании
мобильного
телефона головной
мозг человека
полностью
облучается.



В группу повышенного риска входят люди, которые в течение 10 лет активно используют сотовую связь. У них может возникнуть раковая опухоль головного мозга. Опухоль возникает с той стороны головы, где находится ухо, возле которого человек держал телефон.



Рекомендации по использованию мобильных телефонов

- не использовать сотовые телефоны детям и подросткам до 16 лет, беременным,
- лицам, страдающим заболеваниями неврологического характера.
- ограничить продолжительность разговоров до 3 минут,
- максимально увеличивать период между двумя разговорами (минимум 15 минут),
- во время разговора снимать очки с металлической оправой, так как наличие подобной оправы, играющей роль вторичного излучателя, может привести к увеличению интенсивности ЭМП, падающего на определенные участки головы пользователя, по сравнению со стандартной ситуацией.



Спасибо за внимание!

БОЛЬШО-ОЕ СПАСИБО!

