


АЛГОРИТМ
НЕОТЛОЖНОЙ
ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ПРИСТУПЕ
ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ:

- Резкие боли в поясничной области в проекции почек с иррадиацией в паховую область, внутреннюю поверхность бёдер, половые органы;
- Ишурия;
- Поллакиурия;
- Гематурия;
- Пациент мечется, занимает вынужденное положение.

ДЕЙСТВИЯ М/С:

- Вызов врача
- Придать удобное положение в постели




ДЕЙСТВИЯ М/С:

- Тепло на поясничную область, для уменьшения боли.



ДЕЙСТВИЯ М/С:

- При необходимости провести катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером, для вывода мочи.



ДЕЙСТВИЯ М/С:

- Контроль: АД, P_s, осмотр мочи.



ПРИГОТОВИТЬ ДО ПРИХОДА ВРАЧА:

- Шприцы;
- Инфузионные системы для в/в введения;
- Жгут;
- Стерильные ватные и марлевые салфетки;
- Спирт 70%.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ:

- Баралгин;
- Спазмалгон;
- Промедол.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- Состояние пациента улучшится;
- Боли прекратятся.

