




Первая помощь при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах

Выполнила :
Студентка 289 группы
Сныткина Ирина


Первая помощь

Первая помощь - это временная мера, осуществляемая для того, чтобы спасти жизнь, предотвратить дополнительные травмы и облегчить страдания до оказания квалифицированной медицинской помощи специалистами.



Обморок

Обморок – это Признаки:
состояние, когда бледность, внезапная
человек резко кратковременная
бледнеет, его потеря сознания.
сердечная
деятельность резко
ослабеваает и больной
теряет сознание.



Обморок

- Уложить пострадавшего на спину с приподнятыми ногами;
- ослабить галстук, расстегнуть ворот верхней одежды, ослабить брючный ремень, снять обувь;
- обеспечить доступ свежего воздуха;
- обратиться к врачу для обследования и определения причины обморока.

Солнечный и тепловой удар

Тепловой (солнечный) удар – следствие перегрева организма.

Признаки: слабость, сонливость, жажда, тошнота, головная боль; возможны учащение дыхания и повышение температуры, потеря сознания.



Солнечный и тепловой удар

- Перенести пострадавшего в прохладное, проветриваемое место, уложить пострадавшего ногами кверху
- расстегнуть воротник, ослабить ремень, снять обувь
- при потере сознания более чем на 3–4 минуты перевернуть пострадавшего в устойчивое боковое положение
- положить на голову, шею и паховые области смоченные в холодной воде полотенца (салфетки)
- при восстановлении сознания напоите пострадавшего прохладной минеральной или обычной, слегка подсоленной водой
- вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь».

Отравление

Отравление - заболевание или иное расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание



Способы поступления

яда:

1. Пероральные отравления (поступление токсического вещества через рот)
2. Ингаляционные отравления (поступление токсического вещества через дыхательные пути)

Первая помощь при пероральных отравлениях

- Срочно вызови бригаду «скорой помощи».

Если пострадавший в сознании:

- Растворить в стакане воды 10–20 таблеток активированного угля до состояния кашицы.

Дайте пострадавшему выпить (в качестве абсорбента).

Если пострадавший без сознания:

- Уложите пострадавшего в устойчивое боковое положение;
- укутайте пострадавшего теплыми одеялами, одеждой.

Первая помощь

при ингаляционных отравлениях

- Вынести пострадавшего в безопасное место или открыть окна, проветрить помещение;
- определи наличие пульса на сонных артериях, наличие реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания, при отсутствии немедленно приступай к сердечно-легочной реанимации;
- при восстановлении самостоятельного дыхания и сердцебиения придайте пострадавшему устойчивое боковое положение.
- вызовите «скорую помощь».



**Спасибо за
внимание**