



A vertical stream of red, glowing particles or sparks on the left side of the image, resembling a comet tail or a firework.

Суицид
Суицид

Понятие

Суицид —
преднамеренное
лишение себя жизни,
как правило,
самостоятельное и
добровольное.



Причины суицида

Причин суицида очень много, такие например как:

- **Проблемы в личной жизни:**
 - семейные конфликты, развод;
 - неудачная любовь;
 - смерть или потеря близкого человека;
 - одиночество, недостаток внимания и заботы со стороны окружающих;
 - неудачи на работе, в учёбе;
 - денежные потери;
 - тяжёлое соматическое заболевание или обезображивающий дефект;
 - тяжёлая депрессия (по сводкам, до 15 % депрессий завершаются самоубийством).
- **Доведение до самоубийства:**
 - целенаправленная травля, клевета, угрозы, унижения;
 - Пресыщенность жизнью, усталость от жизни, отсутствие цели и интереса к жизни.
 - Боязнь наказания (страх осуждения со стороны родных или общества у разоблачённых преступников, опасение судебной ответственности).
 - Самоосуждение за неблагоприятный поступок.
 - Подражательное самоубийство (после аналогичных смертей известных личностей).



Разновидности




- Повешение.
- Удушение.
- Утопление.
- Отравление (ядами, снотворным, наркотическими веществами)
- Самосожжение.

- С помощью колющих и режущих предметов, в том числе:
 - падение на меч (в Древнем Риме);
 - вскрытие вен.
- При помощи огнестрельного оружия.
- С помощью электрического тока.
- С помощью использования движущегося транспорта.
- Преднамеренные авиакатастрофы, устроенные пилотами воздушного судна
- Падение с высоты (прыжок с естественных и искусственных возвышений).
- Прекращение приёма пищи.
- Переохлаждение.



Наиболее часто используемыми методами самоубийства в 2005 году в США были:

- Самоубийство с помощью огнестрельного оружия — 52,1 %
- Повешение и удушение — 22,2 %
- Отравление — 17,6 %
- Прочие методы — 8,1 %
- При этом мужчины существенно чаще женщин использовали огнестрельное оружие (57,6 % и 31 % соответственно), а женщины чаще мужчин прибегали к отравлению (39,1 % и 12 %).




Динамика в России

В 2013 году суицид оказался причиной 28 779 из 1 871 809 (1,54 %) смертей в России. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2013—2014 в России на 100 тысяч жителей приходилось 19,5 случаев самоубийства. За первые девять месяцев 2015 года этот же показатель равнялся 17,7.



Половозрастная специфика

- В 2007 году около 22 % всех самоубийств было совершено людьми в возрасте 40—49 лет. Мужчины сводят счёты с жизнью почти в шесть раз чаще, чем женщины.



Алкоголизм в России


Чрезмерное употребление алкоголя является существенным фактором, определяющим распространённость суицида. По оценкам, половина всех самоубийств является результатом злоупотребления алкоголем.





Подростковые самоубийства

Врачи констатируют, что если с 2002 года частота суицида взрослых в России постепенно снижается (с 10-го места в мировом рейтинге стран с самым высоким уровнем самоубийств Россия переместилась на 14-е), то по аналогичному показателю для подростков положительных тенденций нет: из каждых 100 тысяч детей в возрасте 10—14 лет 2,5 кончают с собой, а из подростков 15—19 лет — 16,3.



Happy



Sad



Depressed



Suicidal

Используемые сайты:

- <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>
- <http://psyfactor.org/lib/suicide2.htm>