



Фибринолитикалық дәрілер






Фибринолитикалық дәрілер - жаңа түзілген тромбты ерітеді. Фибринолизинді белсенді фибринолизинге айналдырады. Плазминогеннің плазминге айналуын катализдейді, ұйыған қандағы фибринді ерітеді.


а) тікелей: фибринолизин (плазмин) - фибринді ерітетін протеолитикалық фермент болып табылатын: қан ұюын төмендететін жүйенің бір компоненті. Әсіресе жаңа пайда болған фибрин (суда ерімейтін ақуыз қан ұюына қатысады, тромбиннің әсерінен болатын фибриногеннің (плазма ақуызы) туындысы) жіпшелерін ерітеді.

Fibrinolysinum- фибринолизин (Б): 10000; 20000; 30000 және 40 000 ӘБ құрғақ зат флаконда шығарылып, алдын-ала 100-400 мл 0,9% NaCl ерітіндімен ерітіп, к/т тамшылатып еңгізіледі.

б) тікелей емес: актилизе, стрептокиназа (авелизин, стрептаза), целиаза, стрептодеказа, урокиназа.

Стрептокиназа және оның аналогтары целиаза және урокиназа профибринолизиннің фибринолизинге өтуін күшейтеді. Жіті эмболияда және тромб түзілу қауіпінде **қолданылады**. Стрептодеказа - стрептокиназаның әсері ұзартылған (48-72 сағ. дейін сақталады) препараты.





Жанама әсері: аллергиялық реакциялар.

Streptokinasa - стрептокиназа: 250 000 және 500 000 ӘБ құрғақ зат флаконда шығарылып, 100-150 мл 0,9% NaCl еріт. немесе 5% глюкоза еріт. ерітіп, к/т тамшылатып еңгізіледі.

Актилизе - профибринолизинді фибринолизинге өтуін күшейтетін, плазминогеннің (профибринолизиннің) адамдағы рекомбинантты күшейткіштері. Жіті артериялық және веноздық тромбозда қолданылады.

Антифибринолитикалық дәрілер - фибринолизге кедергі жасайды. Фибринолиздің ингибиторлары плазминогеннің активаторларын бөгейді және плазминнің әсерін тежейді, фибринолиздің белсенділігін және кининдік жүйені тежейді. Гемостатиктер - ұю жүйесінің табиғи компоненттері тромбопластиннің түзілуін белсендіреді.


Бұл препараттар фибринолизиннің (плазминнің) түзілуін тежейді. Қанның фибринолинді белсенділігі жоғарылауымен байланысты қан кетулерде (бауыр ауруларында, жіті панкреатитте), хирургиялық операциялардағы қан кетулерді алдын алу үшін, жаппай қан құюда және фибринолитикалық дәрілердің мөлшерін асырғанда **қолданылады**. Тромбозға, эмболияға бейімділікте, бауыр қызметінің бұзылуында және жүктілікте **қолдануға болмайды**.

Фибринолиздің синтетикалық ингибиторлары: аминокапрон қышқылы, транексам қышқылы (циклокапрон), амбен (памба).

Acidum aminocaproicum - аминокапрон қышқылы: 5% 100 мл еріт. флаконда шығарылып, к/т; 2,0-3,0 ұнт. ішке тәулігіне 3-5 рет белгіленеді.

Антиферментті препараттары: контрикал, гордокс - фибринолизиннің белсенділігін тежейді.

Conthrycal - контрикал: 10 000 ӘБ флаконда шығарылып, нұсқауы бойынша к/т тамшылатып белгіленеді.



Адасқан сөздер:

А	Э	Р	О	Т	Р	И	Т
Т	Т	Л	Е	Й	О	Ц	Т
Л	Р	О	Л	К	О	Ц	И
Е	Ы	М	Б	О	Ц	И	Т
Й	К	Г	Р	Л	Д	А	Ұ
К	О	О	Т	И	М	Ф	Ю
П	З	М	Е	О	С	Т	А
Қ	А	Н	О	Т	Г	Г	З

Орны ауысқан дәрілер:

- 1) Тилказие
- 2) Октреникла
- 3) Сокгрдо
- 4) Нбилрионзифи
- 5) Зецлаиа
- 6) Ркураиноаз