


ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ



Многие ученые вплоть до начала XVII в. считали, что движение небесных тел должно быть равномерным и происходить по «самой совершенной» кривой — окружности.



Иоганн Кеплер

Кеплеру удалось преодолеть этот предрассудок и установить действительную форму планетных орбит, а также закономерность изменения скорости движения планет при их обращении вокруг Солнца.

В своих поисках Кеплер исходил из убеждения, что «в мире правит число», высказанного еще Пифагором. Он искал соотношения между различными величинами, характеризующими движение планет, — размеры орбит, период обращения, скорость.

Кеплер действовал фактически вслепую, чисто эмпирически.

При построении орбиты Марса Кеплер воспользовался собственными наблюдениями планеты, а также многолетними определениями координат и конфигураций Марса, проведёнными его учителем ***Тихо Браге***.



Иоганн Кеплер




Тихо Браге

Орбиту Земли Кеплер считал (в первом приближении) окружностью, что не противоречило наблюдениям.



Иоганн Кеплер


Построение
орбиты Марса Кеплером



Пусть нам известно угловое расстояние Марса от точки весеннего равноденствия во время одного из противостояний планеты (α_1), где T_1 и M_1 – положения Земли и Марса на орбите.

Спустя 687 суток (**звездный период обращения Марса**) планета придет в ту же точку своей орбиты. Земля в этот момент находится в точке T_2 , и, следовательно, угол α_2 есть прямое восхождение Марса.

Повторив подобные операции для нескольких других противостояний Марса, Кеплер получил еще целый ряд точек и, проведя по ним плавную кривую, построил орбиту планеты.



Пусть нам известно угловое расстояние Марса от точки весеннего равноденствия во время одного из противостояний планеты (α_1), где T_1 и M_1 – положения Земли и Марса на орбите.

Спустя 687 суток (**звездный период обращения Марса**) планета придет в ту же точку своей орбиты. Земля в этот момент находится в точке T_2 , и, следовательно, угол α_2 есть прямое восхождение Марса.

Орбиту Земли Кеплер считал (в первом приближении) окружностью, что не противоречило наблюдениям.



Иоганн Кеплер

В ходе построения орбиты планеты Марс Кеплер был поставлен перед необходимостью сделать выбор одного из двух возможных решений:

- 1) считать, что орбита Марса представляет собой окружность, и допустить, что на некоторых участках орбиты вычисленные координаты планеты расходятся с наблюдениями (из-за ошибок наблюдений) на $8'$;
- 2) считать, что наблюдения таких ошибок не содержат, а орбита не является окружностью.


Будучи уверенным в точности наблюдений Тихо Браге, Кеплер выбрал второе решение.


Кеплер установил, что орбита Марса не окружность, а кривая, которая называется **ЭЛЛИПСОМ**, при этом Солнце не располагается в центре эллипса.



Иоганн Кеплер

Эллипс – кривая, у которой сумма расстояний от любой точки до его фокусов есть величина постоянная.





**Иллюстрация
первого закона Кеплера
*на примере движения
спутников Земли***

Первый закон Кеплера

Выберите правильный ответ:

1. выражает закономерность скорости движения планет от их расстояния до Солнца
2. выражает закономерность в ряде чисел, обозначающих средние расстояния планет от Солнца
3. определяет форму орбит планет
4. определяет зависимость гравитационной силы от масс тел и расстояния между ними

Первый закон Кеплера

Выберите правильный ответ:


1. выражает закономерность скорости движения планет от их расстояния до Солнца
2. выражает закономерность в ряде чисел, обозначающих средние расстояния планет от Солнца
3. *определяет форму орбит планет
4. определяет зависимость гравитационной силы от масс тел и расстояния между ними



Иллюстрация
второго закона Кеплера
на примере движения
спутников Земли

Второй закон Кеплера

Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади.



Согласно закону сохранения энергии, полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют силы тяготения, остается неизменной при любых движениях тел этой системы. Поэтому сумма кинетической и потенциальной энергий планеты, которая движется вокруг Солнца, неизменна во всех точках орбиты и равна полной энергии.

По мере приближения планеты к Солнцу возрастает ее скорость – увеличивается кинетическая энергия, но вследствие уменьшения расстояния до Солнца уменьшается энергия потенциальная.



Второй закон Кеплера

Выберите правильный ответ:





Иллюстрация
третьего закона Кеплера
на примере движения
спутников Земли

Третий закон Кеплера

Квадраты звёздных периодов обращения
планет относятся между собой как кубы
больших полуосей их орбит.

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$



Какие из утверждений описывают законы Кеплера?

Выберите правильные ответы:

- 1.*отношение квадратов периодов планет прямо пропорционально отношению кубов их больших полуосей.
- 2.*планеты движутся по своим орбитам с переменной скоростью таким образом, что площади, описываемые радиус-вектором планеты от центра Солнца до планеты за равные промежутки времени, оказываются равными.
- 3.*каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.
- 4.

*«То, что 16 лет тому назад я решил искать, <...>
наконец найдено, и это открытие превзошло все мои
самые смелые ожидания...»*

Иоганн Кеплер



Иоганн Кеплер

Третий закон позволяет вычислить относительные расстояния планет от Солнца, используя при этом уже известные периоды их обращения вокруг Солнца.

Не нужно определять расстояние от Солнца каждой из них, достаточно измерить расстояние от Солнца хотя бы одной планеты.

Величина большой полуоси земной орбиты – **астрономическая единица** (а.е.) – стала основой для вычисления всех остальных расстояний в Солнечной системе.

Задача. Противостояния некоторой планеты повторяются через два года. Чему равна большая

Какая конфигурация планеты относительно Земли?

Дано: $S = 2$ г.

$T_1 = 1$ г.

$a_1 = 1$ а.е.

Найти: $a_2 = ?$

Решение:

Большую полуось планеты определяем из третьего закона Кеплера:

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}, \quad a_2^3 = \frac{a_1^3 T_2^2}{T_1^2}$$

Вычисляем звёздный период планеты:

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}, \quad T_2 = \frac{T_1 S}{S - T_1}, \quad T_2 = \frac{2}{2 - 1} = 2 \text{ г.}$$


Находим большую полуось планеты:

$$a_2 = \sqrt[3]{2^2} \approx 1,59 \text{ а.е.}$$


Ответ: $a_2 = 1,59$ а.е.

Задача. Противостояния некоторой планеты повторяются через два года. Чему равна большая полуось её орбиты?

Какая конфигурация планет соответствует задаче?



1



2



3



4

