Понятие

ДВИЖЕНИЯ

Отображение плоскости на себя



Поставим в соответствие **<u>каждой</u>** точке плоскости какую-либо точку этой же плоскости.

Говорят, что дано отображение плоскости на себя.

$X \rightarrow X_1$ по какому-либо правилу

Каждое правило определяет какое-то отображение

Осевая симметрия

Пусть дана какая-то прямая **m**, которую назовем осью симметрии. Осевой симметрией называется отображение плоскости на себя, при котором каждой точке X ставится в соответствие точка X_1 по следующему правилу:

$$XX_1 \perp m$$

Прямая m делит отрезок XX_1 пополам



Как для точки M построить точку M_1?

Из точки M опустим перпендикуляр MP на прямую **m**.

Отложим на прямой MP отрезок PM_1, равный отрезку MP.

Точка, лежащая на прямой **m**, симметрична сама себе

Построение отрезка, симметричного данному относительно прямой m



Построение треугольника, симметричного данному относительно прямой m



Построение окружности, симметричной данной относительно прямой m



Фигуры, имеющие ось симметрии















Центральная симметрия

Пусть дана какая-то точка О, которую назовем центром симметрии. Центральной симметрией называется отображение плоскости на себя, при котором каждой точке Х ставится в соответствие точка X_1 по следующему правилу:

О – середина отрезка XX_1



Как для точки М построить точку M_1?

Проведем луч МО

Отложим на луче МО отрезок OM_1, равный отрезку ОМ.

Точка О (центр симметрии) симметрична сама себе.

Построение отрезка, имметричного данному относительно точки О





Построение треугольника, симметричного данному относительно точки О



Фигуры, имеющие центр симметрии













Параллельный перенос

Пусть $\vec{a}$ *– данный вектор.*

Параллельным переносом на вектор $\vec{a}$ *называется отображение плоскости на себя, при котором каждой точке* X *ставится в соответствие точка* X_1 *по правилу :* $\overrightarrow{XX_1} = \vec{a}$



Как для точки M построить точку M_1?

От точки M отложим вектор MM_1, равный данному вектору *a*

$$\overrightarrow{MM_1} = \vec{a}$$

Параллельный перенос отрезка на данный вектор



$$\overrightarrow{AA_1} = \vec{a}$$

$$\overrightarrow{BB_1} = \vec{a}$$

Параллельный перенос треугольника на данный вектор



Поворот

Пусть даны точка O (центр поворота) и угол α (угол поворота). Поворотом плоскости вокруг точки O на угол α называется отображение плоскости на себя, при котором каждой точке X ставится в соответствие точка X_1 по следующему правилу:

$$\angle XOX_1 = \alpha$$
$$OX = OX_1$$



Как для точки M построить точку M_1?

Проведем отрезок OM

Отложим от отрезка OM угол, равный α (направление поворота задается условием задачи).

На второй стороне угла α отложим отрезок OM_1, равный отрезку OM.

Поворот отрезка на угол α



Поворот треугольника на угол α



Движение плоскости

- Отображения плоскости на себя, которое сохраняет расстояние между точками, называется движением плоскости.



$A \to A_1$

$B \to B_1$

$AB = A_1B_1$



f - движение

$A \to A_1$

$B \to B_1$

$C \to C_1$

$AB = A_1B_1$

$BC = B_1C_1$

$AC = A_1C_1$



Движение



$$XY = X_1Y_1$$

Теорема. Осевая симметрия - движение

Дано: f – осевая симметрия,
прямая m - ось симметрии
$X \to X_1$
$У \to У_1$
Доказать: $ХУ = Х_1У_1$



Проведем $XZ \perp УУ_1$ *и* $X_1Z_1 \perp УУ_1$

$$\begin{cases} XZ = X_1Z_1 \\ YZ = Y_1Z_1 \end{cases} \Rightarrow \quad \Delta XYZ = \Delta X_1Y_1Z_1$$

Из равенства $\Delta XYZ = \Delta X_1Y_1Z_1 \Rightarrow XY = X_1Y_1$

Теорема. Центральная симметрия - движение



Дано: f – *центральная симметрия,*
O - *центр симметрии*
$X \to X_1$
$У \to У_1$

Доказать: $XУ = X_1У_1$

$$\Delta XУO = \Delta X_1У_1O \left(Почему?\right) \Rightarrow XУ = X_1У_1$$

Поворот - движение

Дано: f – поворот вокруг точки О на угол α

$X \to X_1$, $У \to У_1$

Доказать: $ХУ = X_1У_1$



$$\Delta XOУ = \Delta X_1OУ_1 \quad (почему?)$$

$$\Downarrow$$

$$ХУ = X_1У_1$$

Свойства движения

1. *При движении отрезок отображается на отрезок*



f – *движение*

$A \to A_1 \quad B \to B_1$

$P \in AB \quad P \to P_1$

Доказать: $P_1 \in A_1B_1 \quad (A_1P_1 + P_1B_1 = A_1B_1)$

f – *движение*

$A \to A_1 \quad B \to B_1 \quad P \to P_1$

$AB = A_1B_1 \quad AP = A_1P_1 \quad PB = P_1B_1$

$P \in AB \to AP + PB = AB$

$A_1P_1 + P_1B_1 = AP + PB = AB = A_1B_1$

Получили: $A_1P_1 + P_1B_1 = A_1B_1 \Rightarrow P_1 \in A_1B_1$

НАЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ

Фигура F равна фигуре F_1, если фигуру F можно совместить с фигурой F_1 наложением.





$$XY = X_1Y_1$$

Наложение – это отображение плоскости на себя.
При наложении отрезок отображается в равный себе отрезок.
Значит наложение – это движение.

Теорема. Любое движение является наложением



g – произвольное движение

$$\Delta ABC \xrightarrow{g} \Delta A_1B_1C_1$$

$$\Delta ABC = \Delta A_1B_1C_1$$

По определению равных треугольников существует наложение f , при котором точки A, B, C отображаются соответственно в точки A_1, B_1, C_1 .

Докажем, что движение g совпадает с наложением f.

Предположим противное. Тогда на плоскости найдется точка M, которая при движении g отображается в точку M_1, а при наложении f – в точку M_2.

Так как при движении g и наложении f сохраняются расстояния, то $AM = A_1M_1$ и $AM = A_1M_2$, поэтому $A_1M_1 = A_1M_2$

Вывод: Точка A_1 равноудалена от точек M_1 и M_2 → $A_1 \in \ldots$

Аналогично: Точка B_1 равноудалена от точек M_1 и M_2 → $B_1 \in \ldots$

Точка C_1 равноудалена от точек M_1 и M_2 → $C_1 \in \ldots$

Получили, что точки A_1, B_1, C_1 лежат на серединном перпендикуляре к отрезку M_1M_2, что невозможно, так как вершины треугольника не лежат на одной прямой.

Вывод: наше предположение неверно. Следовательно, движение g совпадает с наложением f.