

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА

Выполнил: Антоненков Никита 11А

Основные признаки внезапной остановки сердца:

- ❑ Внезапная потеря сознания: когда стоящий или сидящий человек падает, при этом также нередко наблюдается судорожное напряжение мышц.
- ❑ Внезапное полное прекращение дыхания: часто претворяется хрипящими и/или булькающими звуками, похожими на попытку что-то сказать.



РЕАНИМАЦИЯ

Восстановление или временное замещение резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций организма.



Что такое первая помощь?

Первая помощь – это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и жизни пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека. Каждый человек должен уметь оказать первую помощь, в соответствии со своими способностями и возможн





Как определить пульс пострадавшего?


1. Определяйте пульс только кончиками двух пальцев. Положите их справа от кадыка, без нажима.
2. Скользите пальцами назад, по стороне кадыка, так, чтобы они попали в вертикальную бороздку между ним и мышцей, расположенной сбоку от него.
3. Если вы не почувствовали пульс сразу, надавите кончиками пальцев чуть ближе и чуть дальше от кадыка, пока не нащупаете биение.



Как выполняется непрямой массаж сердца?



Что происходит с сердцем во время массажа?



Правила выполнения искусственного дыхания



запрокидывание головы



выдвижение челюсти




метод «рот в рот»



метод «рот в нос»

Сочетание непрямого массажа сердца и ИВЛ



WHO 861 572

Алгоритм элементарной реанимации

1. Проверить у пострадавшего наличие пульса на сонной артерии.
2. Проверить наличие дыхания.
3. Уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность, расстегнуть одежду, стесняющую грудь, обеспечить свободную проходимость дыхательных путей.
4. Встать рядом с пострадавшим слева от него на колени.
5. Если нет пульса на сонной артерии и дыхания, срочно приступить к реанимации, начать делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
6. Проводить реанимацию до прибытия врачебной помощи.

!!!!!! Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и нитроглицерин, принятые в первые минуты, могут предотвратить риск развития инфаркта миокарда и значительно уменьшают риск смерти от него