


Укусы бешеных животных

Бешенство - болезнь
животных и людей,
вызываемая вирусом и
представляющая
смертельную опасность.



Возбудитель - содержащий рибонуклеиновую кислоту нейротропный вирус, поражающий животных и человека. Возбудитель неустойчив к высоким температурам и устойчив к низким. Быстро разрушается под действием щелочей и кислот, неустойчив к йодистым препаратам и фенолу.



Природные очаги бешенства

- Лисы
- Енотовидные собаки
- Волки
- Шакалы
- Куницы
- Барсуки







Городские и сельские очаги

Собаки



Кошки



Заражение домашних животных происходит обычно при их непосредственном контакте с больными представителями дикой фауны и безнадзорными собаками и кошками.

Домашние животные, как и человек, заражаются через укус или при ослюняивании поврежденной поверхности кожного покрова.



Вирус бешенства непродолжительное время находится на месте внедрения, затем проникает в спинной и головной мозг, где размножается на нервных узлах. Затем он выходит в протоки слюнных желез и на поверхность слизистой оболочки, заражая слюну. Вирус проникает также в область глаз, легкие, надпочечники, почки, скелетные мышцы, поджелудочную железу, молочные железы (выделяется с молоком).

Симптомы бешенства

- Скрытый (инкубационный) период от 14 суток до 3-х месяцев
- Период клинических проявлений:
 - Возбуждение
 - Гидрофобия
 - Светофобия
 - Отсутствие страха перед человеком
 - Обильное слюноотечение
 - Паралич
 - Смерть

Профилактика бешенства среди ЖИВОТНЫХ

- Регулирование плотности популяции диких животных
- Отлов бездомных собак и кошек
- Соблюдение правил содержания домашних собак и кошек (регистрация, применение намордников, содержание на привязи и т. п.)
- Обязательная ежегодная профилактическая иммунизация против бешенства домашних животных, в первую очередь собак
- Контроль за перевозками домашних животных
- Пероральная иммунизация диких животных.



Курс профилактической иммунизации
против бешенства проводится лицам,
профессионально связанным с риском
заражения бешенством (собаководы,
сотрудники ветеринарных
диагностических лабораторий, охотники
и др.)



Вакцинопрофилактику начинают немедленно при:

- Всех укусах, царапинах, ослюнении кожных покровов и слизистых оболочек, нанесенных явно бешеными, подозрительными на бешенство и неизвестными животными
- При ранении предметами, загрязненными слюной или мозгом бешеных или подозрительных на бешенство животных
- При укусах через одежду, если она проколота или разорвана зубами
- При укусах, ослюнении и нанесении царапин здоровым в момент контакта животным, если оно в течении 10-дневного наблюдения заболело, погибло или исчезло
- При укусах дикими грызунами



Собаки, кошки и другие животные,
покусавшие людей или животных,
подлежат немедленной доставке
владельцем (организацией, хозяйством)
или специальной бригадой по отлову
бродячих животных в ближайшее
ветеринарное лечебное учреждение для
осмотра и содержания под
наблюдением специалистов в течение
10 дней.



Все больничные, амбулаторно-поликлинические учреждения при обращении лиц, укушенных, оцарапанных, ослюненных любыми животным, а также лиц пострадавших при разделке туш, при вскрытии трупов животных павших от бешенства, или при вскрытии трупов людей умерших от бешенства, обязаны немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и направить его в травматологический пункт (кабинет), а при отсутствии последнего - в хирургический кабинет для назначения и проведения курса антирабических прививок.



Первая помощь при укусах:

- Произвести местную обработку раны раствором хозяйственного мыла
- Края раны обработать антисептиком
- Наложить стерильную повязку
- Доставить пострадавшего в медучреждение