

~~1.~~—

~~2.~~—

~~3.~~—

~~4.~~—


~~5.~~—

~~6.~~—



1. —


2. —




3. —




промежности сзади.










● —

● —









1. —

2. —


3. —

4. —

5. —

6. —

7. —



окрытые оболочками семенного канатика и яичка



100

80


60

40


20

0






Развитие внутренних мужских половых органов (схема).
(Левое яичко представлено в более ранней стадии,
правое прошло через паховый канал.)




- В 3 месяца внутриутробного развития мошонка пустая, представлена только кожей и мясистой оболочкой. Яичко находится на уровне L₅ забрюшинно. От нижнего полюса яичка до дна мошонки простирается направляющая связка яичка. Связка не растет и подвергается ретенции, что обеспечивает опускание яичка.
- К 7 месяцам в мошонку вытягиваются фасциальные оболочки яичка, само яичко находится над входом в паховый канал.
- Яичко опускается в мошонку в середине 9 месяца. Влагалищный отросток, по которому проходило яичко зарастает на первом месяце после рождения.





располагаются
забрюшинно.







Простата состоит из
селезистой ткани — 50%,
гладкой мускулатуры и
соединительной ткани —
о 25%.




Нормальная
простата



Пораженная раком
простата

Бульбоуретральные (Куперовы) железы




Две трубчато-альвеолярные железы величиной с горошину, располагаются в толще мышц мочеполовой диафрагмы



Выводной проток открывается в мочеиспускательный канал.

Выделяют тягучую жидкость, которая:

- защищает стенки мочеиспускательного канала от раздражения мочой.
- нейтрализует следы кислой мочи в уретре и помогает удалить остаточную мочу.



1. —


2. —





3. —

4. —

5. —

6. —





•

•

•

•

•

•



