

Симптоматические психозы

- ▣ Психозы, развивающиеся при инфекционных, общих неинфекционных, а также при интоксикациях, в качестве одного из симптомов основного заболевания.
- ▣ В основе симптоматических психозов лежит концепция об экзогенном типе реакций, т.е. об общности психических реакций при воздействии различных экзогенных вредностей.

Симптоматические психозы

- ▣ Выделяют пять типов неспецифических реакций: оглушение, делирий, аменция, сумеречное помрачение сознания и острый галлюциноз.
- ▣ В качестве вариантов экзогенных реакций в неё позднее были включены маниакальноподобные, депрессивные, кататоноформные и параноидные синдромы, а также астенический и амнестический (корсаковский) симптомокомплексы.

Симптоматические психозы

- ▣ Особенности клинической картины экзогенных психозов определяются этапом основного заболевания: продромальному периоду заболевания соответствуют явления астении, на высоте лихорадки обычно развивается делирий, при снижении температуры тела – аменция, а в период выздоровления – астенический синдром.
- ▣ Астенический синдром – повышенная психическая и физическая истощаемость;
Висцеро-вегетативные расстройства;
Нарушения сна

Симптоматические психозы

- Частота возникновения этих психозов колеблется от 1,2 до 8%. Симптоматические психозы с известной долей условности разделяют на острые (транзиторные) и затяжные.
- Острые симптоматические психозы
- Обычно протекают с транзиторным помрачением сознания (оглушение, делирий, онейроид, аменция и сумеречное помрачение). Острому симптоматическому психозу обычно предшествует весьма кратковременный продромальный период,

Симптоматические психозы

- сопровождающийся признаками астенического синдрома. Возникающие вслед за этим острые психотические расстройства продолжаются от нескольких часов до 2-3 суток. Чаще всего развивается помрачение сознания с картиной делирия или эпилептиформного возбуждения.
- Довольно частый вид реагирования на инфекцию – развитие аменции, особенно когда соматическое заболевание возникает на фоне ослабления организма.

Симптоматические психозы

- При инфекционных и неинфекционных заболеваниях без выраженного токсикоза (ревматизм, малярия и т.д.) могут развиваться онейроидные состояния, они кратковременны.
- Острые симптоматические психозы могут протекать без помрачения сознания, в виде острого вербального галлюциноза.

Симптоматические психозы

- ▣ Затяжные симптоматические психозы
- ▣ При затяжном неблагоприятном течении общего соматического или инфекционного психоза синдромы помрачения сознания сменяются затяжными (протрагированными, пролонгированными) симптоматическими психозами. Они продолжаются от 2 недель до 20-3 мес. и заканчиваются развитием длительного состояния астении или (реже) сменяются более тяжелым и малообратимым расстройством – психорганическим синдромом.

Симптоматические психозы

- ▣ Чаще всего затяжные симптоматические психозы протекают с картиной депрессии, депрессивно-бредового, галлюцинаторно-параноидного состояния, апатического ступора, маниакальных расстройств, конфабулеза и транзиторного корсаковского синдрома.
- ▣ При всех видах затяжных психозов выражена астения.
- ▣ Депрессивно-бредовые состояния - бред осуждения, обвинения, нигилистическими переживаниями вполне конкретного содержания

Симптоматические психозы

- иллюзии и отдельными вербальными галлюцинациями.
- Смена депрессивно-бредового синдрома галлюцинаторно –бредовым указывает на ухудшение общего соматического состояния.
- Галлюцинаторно- бредовые состояния при затяжных психозах близки к острому параноиду с бредом преследования, вербальными галлюцинациями, иллюзиями и ложными узнаваниями.

Симптоматические психозы

- Апатический ступор развивается при крайне тяжелом течении основного заболевания. Полное безразличие ко всему.
- Конфабулез отличается своеобразием. Нарушения памяти отсутствуют. Психоз выражается в постоянных рассказах больных о своих вымышленных невероятных приключениях. По окончании конфабулеза больной демонстрирует полную критику к пережитому состоянию

Симптоматические психозы

- Наряду с характерным для всех симптоматических психозов переходом в состоянии астении, отмечают и другой вариант исхода.
- Психорганический синдром
- Варианты : Астенический; Эксплозивный; Эйфорический; Апатический.

Симптоматические психозы

Грипп – острый делирий или тревожно – тоскливым возбуждением с бредовыми идеями самообвинения , греховности.

Туберкулез- выраженная астения, повышенная раздражительность, слабость, вегетативные нарушения чаще гипергидроз. При фиброзно-кавернозном туберкулезе легких повышение фона настроения с эйфорией. При появлении эпилептиформных припадков признак образования туберкулом в мозге.

Симптоматические психозы

- ▣ Вирусная пневмония- делирий, онейроид.
- ▣ Соматические заболевания
- ▣ С.С.Н.- по типу выключения сознания иногда состояния по типу эйфории.
- ▣ Инфаркт миокарда- в острой стадии аффективные расстройства в виде страха, паники. В подострой стадии И.М. отмечают легкое оглушение или психотическое состояние с обилием сенестопатий.
Эйфорические состояния

Симптоматические психозы

- ▣ Язвенная болезнь - повышенная тревожность, наличие обязательно психотравмирующей ситуации. Идеи самообвинения, депрессии.