

Ночное дежурство

с 13. 12.2017г по 14.12.2017г

- **Дежурные врачи:** Серикбаев А.Р., Абдрахманова Б.Т
- **Реаниматолог:** Онтаев Б.Б
- **Врачи интерны:** Маккамбаева Л .ТО-706., Альчинбаева Г ТО-707., Усен Н ТК-609., Абдусаметова А ТО-609
- **Поступление:** 5
- **Отказы:** 27
- **Под наблюдением:** 11 (ревматология-11).
- **Беременные:** 5 (нефрология -2, аллерго – пульмонология 3).

Поступление в отделение ревматологии:2

- 1.Шайманова П.М 1969 г.р. СМП 13.12.2017 г. 18:05
Тассай ул Досымбекулы 8а
- Д/з: Оsn: Артериальная гипертензия III степени. Риск3 (избыточный вес, ГЛЖ).
- Осл: Криз II типа 13.12.2017г.
- АД 180/100 мм.рт.ст. ЧСС=Пuls 65 в мин. ЧДД - 18 в мин. Т - 36,6 С.

- **План лечения:** Режим I. Диета №. 10
- Caps. Hartil Amlo 10/5 mg по 1 табл per os вр:08:00
- Tabl. Physiotensi 0,4 mg по 1 табл per os вр:12:00
- Tabl. Indapamidi 2,5 по 1 табл per os вр:07:00
- Tabl. Ass –Trombini 100 mg по 1 табл per os вр:21:00

- **2.Карабаева А.Т 1948г.р СМП 13.12.2017г вр 23:30
полик Айнуры**
- **Осн:** Хроническая сердечная недостаточность ФК III (НУНА).
- **Осл.:** Застойная двухсторонняя нижнедолевая пневмония. ДН II.
- **Фон:**1.ИБС. Перенесенный инфаркт миокарда в 2015г. Стентирование ПНА в 2015г.
- 2.Артериальная гипертензия III ст., риск 4 (ГЛЖ, возраст, ИБС, СН,СД).
- **Осл:** Гипертоническое сердце IV стадия
- **Фон:**3 Сахарный диабет 2 типа, компенсация.
- АД 130/90 мм.рт.ст. ЧСС=Пuls 88 в мин. ЧДД - 30 в мин. Т - 36,5 С.

- **План лечения:** Режим I. Диета №. 10
- Tabl.Captoprili 25мг 1/4 таб 3р/д-08:00-16:00-23:00
- Sol.Pentoxifyllini 2%-5ml + Sol.Natrii Chloridi 0.9%-200ml в/в кап-но
- Tabl.Furosemidi 0,04 1 табл./сут
- Cef III 1,0 + Sol.Natrii chloridi 0,9% -10 ml в/в п/пробы 3 раза в сутки;

В отделение алерго - пульмонологии:1

- **1.Оспанова Ф.А 1991г.р СМП 13.12.2017г вр 22:30
полик №3**
- Д/З: Осн: Хронический обструктивный бронхит фаза обострения.
- Осл: ДН II.
- Соп: 5 Беременность 24-25 недель.
- АД 120/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пuls 78 в мин. ЧДД - 23 в мин. Т - 36,4 С.

- **План лечения:**
- Режим II Диета №15
- Amoxillini 1.0 + Sol. Natrii Chloridi 0,9%-100 в/в кап. п/пробы 09:00 № 8
- Sol. Ambro 2ml + в/м стр.2 раза в день, 10:00-20:00 №8
- Sol.Beroduali 2 ml через небулайзер 2 р/д 10:00-17:00 №5
- Sol.Acidi ascorbinisi 5%- 4мл в/в стр. 11:00 №5

- **1. В отделении реанимации через отделение неврологии:1**
- **1.Калмурзаев М.К 1964г.р СМП 14.12.2017г вр 02:10 мкр 15-14-6**
- Д\з: Оsn:Симптоматическая фокальная эпилепсия генерализованный тонико-клоническими приступами с частотой 4-5 раза в месяц. Эпистатус от 14.12.2017г
- Осл: Выраженный гипертензионный синдром. Состояние после удаление гематомы в теменной затылочной области слева от 2013г
- Кон: Последствие повторной тяжелой черепно-мозговой травмы с учетом голвного мозга (1992г,2013г)
- АД 100/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 78 в мин. ЧДД - 22 в мин. Т - 36,4 С.

- **В отделении неврологии:1**
- **1.Жапбарова Г 1989г.р 114.12.17г вр 03:20 полик ШГМБ**
- Д\з:Осн: Остеохондроз поясничного отдела позвоночника с корешково-болевым синдромом
- Соп: 4 Беременность 29 недель
- АД 110/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 78 в мин. ЧДД - 22 в мин. Т - 36,4 С.

Под наблюдением

- В отделении ревматологии: 11
- 1. . *Гилязиева Ф.Г 1955г.р СМП 13.12.2017г вр 09:4*
палата№6
- Д/з: **осн:** Острая левожелудочковая недостаточность.
Сердечная астма от 13.12.2017г
- Хроническая сердечная недостаточность. ФК III (NYHA)
- **Осл:** Гипертоническая сердце 3ст, риск 4(возраст, ГЛЖ, СН)
- **Фон:** Артериальная гипертензия III степени, риск 4.
- **Осл:** Гипертоническое сердце 3 ст.
- **Фон:** Нарушение проводимости АВ блокада 3 ст.ЭКС от 2013г
- АД 130/90 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 89 в мин. ЧДД 20 в мин. Т

Лечение

Tabl. Izomiki Longi 40 mg по 1 табл 2p\в\с

Caps. Aldaroni 0,1 по 1 табл 1p\в\с

Tabl.Furosemidi 40 mg по 2 табл 1p\в\с

Sol. Pentoxifyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml в/в
кап

Tabl. Vazari 80 mg по 1 табл 1p\в\с

- **2. Жуматаев С 1944г.р 13.12.17г**
- Д\з: Хроническая сердечная недостаточность ФК 3 (NYHA).
- Осл: Застойная двусторонняя нижнедолевая пневмония. ДН 2
- Фон 1): Артериальная гипертония 3 степени. Риск 4(возр, ГЛЖ, СН, СД)
- Осл: Гипертоническое сердце 4 стадия
- Фон 2): Сахарный диабет 2 типа стадия декомпенсации, тяжелое течение. Диабетическая нефропатия. СКФ-69 мл\мин.
- АД - 130/90 мм.рт.ст. ЧСС = 84 р/мин. Пульс - 84 в мин. ЧДД - 22 в мин. Т- 36,6 С.

Лечение

- Tabl.Fozinoprili 20mg 1таб*1р/д
- Sol. Pentoxiphyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml
в/в кап
- Tabl.Furosemidi 40 mg по 1табл 1р\в\с
- Tabl.Clovixi 0.3 1\4 таб х 1раз\сутки
- Tabl.Phyziotensi 0.4 mg 1 таб х 1раз\сутки
- Cef III 1,0 + Sol. Natrii chloridi 0,9%-10мл в/в стр X 2 раза в
сутки

- **3.Жанабаева К. 1925г.р. СМП 08.12.2017г. палата №6.**
- Д/з: ХСН ФК 3 по (НУНА)
- Осл: Застойная двусторонняя нижнедолевая пневмония ДН 2
- Фон: Артериальная гипертония 3 ст , риск 4 (возр, ГЛЖ, СН)
- Осл: Гипертоническое сердце в стадии декомпенсации
- Осл: нарушение ритма : фибрилляция предсердий , постоянная форма.
- АД 120/70 мм.рт.ст. ЧСС 82 в мин. Пульс 82 в мин. ЧДД 20 в мин. Т 36,4⁰С.

Лечение

- Tabl. Captoprili 25mg 1\2 *3 p/c per os
- Sol. Pentoxifyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml в/в кап
- Sol.Furosemidi 1% -8ml + Sol.Natrii chloridi 0.9% - 100 ml в/в кап. 1 p/сутки
- Tabl.Digoxini 0.25mg 1\2 таб 1p\сутки
- Sol. Heparini 5000 Ed в\в стр

- **4.Қалтаева М.З 1972г.р. СМП 08.12.2017г. 13:30.**
Палата №8

- Д/з: Дилатационная кардиомиопатия

- Осл: СНФК II (НУНА).

- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 75 в мин. ЧДД 20 в мин.
Т 36,6 С.

Лечение

- Tabl.Fozinoprili 10mg 1таб*1р/д
- Sol. Pentoxyphyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml
в/в кап
- Sol.Furosemidi 1% -6ml + Sol.Natrii chloridi 0.9% - 50 ml
в/в кап. 1 р/сутки
- Sol. Fraxiparini 0.4 ml п/к 2 р/сутки
- Caps. Aldaroni 100mg 1кап*1р/д

- **5.Бекмухамедова Ш.Б 1960г.р. СМП 11.12.2017г.**
12:30. Палата №5
- Д/з: Симптоматическая артериальная гипертензия.
- Криз от 11.12.17г. СН ФК I (НУНА)
- Фон: Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, обострение.
- Осл: ХБП 1

- АД 120/80 мм.рт.ст. ЧСС =Пульс 74 в мин. ЧДД 18 в мин. Т 36,5⁰С.

Лечение

- Tabl. Fozinopriili 10mg 1 таб*1р/д
- Sol. Pentoxifyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml
в/в кап
- Cef III 1,0 + Sol. Natrii chloridi 0,9%-10мл в/в стр X 2 раза в
сутки
- Ketotopi 2 мл+ Sol. Natrii chloridi 0,9%-100мл в/в кап X 2
раза в сутки

- **6.Жумабаев М.К 1964 г.р СМП 05.12.2017 г. 14:30.**
Палата № 12
- Д/з: Хроническая сердечная недостаточность ФК III (НУНА)
- Фон: 1.ИБС. Перенесенный инфаркт миокарда 06.01.16г.
Стентирование ПКА 06.01.16г ОА 15.06.2016г.
Маммарокоронарное шунтирование ПМЖВ,
Аутовенозного шунтирование ОА, ЗМЖВ, ЗБВ и
аннулопластика МК мягким опорным кольцом DURAN-27 в
условиях искусственного кровообращения 16.12.16г.
- Осл: Аневризма левого желудочка
- -нарушение ритма сердца: фибрилляция предсердий,
постоянная форма
- Фон: Артериальная гипертензия III степени, риск 4 (насл,
ГЛЖ,ИБС,ПИМ)
- АД - 110/70 мм.рт.ст. ЧСС = 96 рет/мин. Пульс - 86 в мин.
ДП-10. ЧДД - 22 в мин. Т- 36,6 С.

Лечение

- Tabl.Digoxini 0.25 мг 1\2 табл x2p\с
- Sol. Pentoxuphyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml
в/в кап
- Sol.Furosemidi 1% -10ml + Sol.Natrii chloridi 0.9% - 50 ml
в/в кап. 1 р/сутки
- Tabl.Clovixi 300 1\4 таб x 1раз\сутки

- **7.Примбеков А 1926г.р СМП 12.12.2017г. 10:40.**
Палата №12
- Д/з: ХСН ФК 3 (НУНА)
- Осл: Застойная двусторонняя нижнедолевая пневмония ДН 2
- Фон: Артериальная гипертензия 3 ст , риск 4 (возр, ГЛЖ, СН)
- Осл: Гипертоническое сердце в стадии декомпенсации. НРС. фибрилляция предсердий, постоянная форма.
- АД - 120/90 мм.рт.ст. ЧСС 100, Пульс 92 в мин. ДП-8. ЧДД 22 в мин. Т 36,5 С.

Лечение

- Tabl. Fozinoprili 10mg 1таб*1р/д
- Sol. Pentoxyphyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml
в/в кап
- Tabl. Furosemidi 40 mg по 1табл 1р\в\с
- Caps. Aldaroni 100mg 1кап*1р/д
- Sol. Hepasani 5 000 ЕД п\к*3р/с
- Tabl. Biprololi 0.01 g по 1\4 табл*1р/с
- Cef III 1,0 + Sol. Natrii chloridi 0,9%-100мл в/в кап X 1 раза
в сутки

- **8.Калкабаев Т.А 1965г.р СМП 11.12.2017г 13:00 палата №12**
- Д\з: Осн: Ревматоидный артрит, поздняя стадия ФК 3
- Конк: 1.Артериальная гипертензия 2 ст , риск 4 (возр, ГЛЖ, СН, СД)
- Осл: СНФК II (НУНА).
- Конк: 2. Сахарный диабет 2 типа , в ст декомпенсации
- Осл: Диабетическая нефропатия
- Фон: Хронический пиелонефрит в стадии обострения.
- АД - 130/90 мм.рт.ст. ЧСС = 78 р/мин. Пульс - 78 в мин. ДП – 18 р/мин. ЧДД - 18 в мин. Т- 36,6 С.

Лечение

- Sol. Metojecti 20 мг 1р\в\нед.
- Tabl. Acidi folici 0,001 1таб*1р/д
- Tabl .Prednizaloni 0,05 2таб*1р/д
- Sol. Pentoxyphyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml
в/в кап
- Sol.Ketonali2 мл+ Natrii chloridi 0.9%-100 ml в/в кап
- Caps. Omegasti 0,02 по 1 капс *2р/д
- Tabl. Teveteni 0,008 1таб*1р/д
- Tabl. Indamidi 0,025 1таб*1р/д

- **9.Кобенова П 1942г.р СМП 06.12.17г вр 15:50 палата№ 3**
- Д\з: Хроническая сердечная недостаточность ФК 3 (NYHA).
- Осл: Застойная двусторонняя нижнедолевая пневмония. ДН 2
- Фон: Ишемическая кардиомиопатия
- Нарушение проводимости: полная блокада левой ножки пучка Гиса.
- Фон: Артериальная гипертензия 3 степени. Риск 4(пол, изб.вес,ГЛЖ,ИБС, СН,СД)
- Осл: Гипертоническое сердце 4 стадия
- Фон:Сахарный диабет 2 типа стадия декомпенсации, тяжелое течение. Диабетическая нефропатия.
- АД - 100/60 мм.рт.ст. ЧСС = 78 р/мин. Пульс - 78 в мин. ЧДД - 18 в мин. Т- 36,6 С.

Лечение

- Tabl. Captoprili 25mg 1\2 *3 p/c per os
- Sol. Pentoxifyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml в/в кап
- Sol.Furosemidi 1% -6ml + Sol.Natrii chloridi 0.9% - 10 ml в/в стр. 1 p/сутки
- Sol. Непасани 5 000 ЕД п\к*3p/c
- Tabl. Biprololi 0.01 g по 1\4 табл*1p/c
- Cefazolini 1.0+ Natrii chloridi 0.9%-10ml в/в стр 3раза\сутки

- **10.Тешебаев А.И 1959 г.р СМП 12.12.2017г. 13:10.**
Палата № 12

- Д/з: ХРБС. Комбинированный митрально-аортальный порок сердца.
- Осл: СН ФК III (НУНА)
- Застойная двусторонняя нижнедолевая пневмония. Правосторонний гидроторакс. ДН 2.
- АД - 130/90 мм.рт.ст. ЧСС = 110 р/мин. Пульс - 92 в мин. ДП – 18 р/мин. ЧДД - 25 в мин. Т- 37,6 С.

Лечение

- Tabl. Captoprili 25mg $\frac{1}{4}$ *3 p/c per os
- Sol. Pentoxifyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml в/в кап
- Tabl.Furosemidi 1%-6ml + Natrii chloridi 0.9%-10ml в/в стр по 1 табл 1p/c
- Tabl.Digoxini 0.025%- 1ml+ Natrii chloridi 0.9%-10 ml в/в 2p\сутки
- Caps. Aldaroni 100mg 1кап*1p/д
- Sol. Непасани 5 000 ЕД п\к*3p/c
- Cef III 1,0 + Sol. Natrii chloridi 0,9%-100мл в/в кап X 1 раза в сутки

- **Пронин А.А 1948г.р СМП 06.12.2017г. 10:20. Палата №12**
- Д/з: ХСН ФК 3 по (НУНА)
- Осл: Застойная двусторонняя нижнедолевая пневмония ДН 2
- Фон: Артериальная гипертензия 3 ст , риск 4 (возр, ГЛЖ, СН)
- Осл: Гипертоническое сердце в стадии декомпенсации
- АД 125/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 76 в мин. ЧДД 19 в мин. Т 36,5 С.

Лечение

- Tabl. Captoprili 25mg $\frac{1}{4}$ *3 p/c per os
- Sol. Pentoxifyllini 2 %-5 ml+Natrii chloridi 0.9%-200 ml в/в кап
- Tabl.Furosemidi 1%-6ml + Natrii chloridi 0.9%-10ml в/в стр по 1 табл 1p/c
- Tabl.Digoxini 0.025%- 1ml+ Natrii chloridi 0.9%-10 ml в/в 2p\сутки
- Cef III 1,0 + Sol. Natrii chloridi 0,9%-100мл в/в кап X 1 раза в сутки

- **Беременные: 5**
- **В отделении аллерго - пульмонологии:3**
- **1.Умарова Ш.И. 1994г.р. СМП 12.12.2017г. палата №1.**
- Д/з: Хронический обструктивный бронхит, в стадии обострения.
- Осл: ДН 2
- 1 беременность раннего срока.

- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 87 в мин. ЧДД 19 в мин.
Т 36,4⁰С.

Лечение

Amoxicillin 1,0 + Natrii chloridi 0.9%-20 ml в\в стр 2 р\с

- Sol. Acidi Ascorbinici 5% - 4ml в\в стр
- Sol. Ambro 2ml в\м
- Sol. Trisoli 400мл в/в кап
- Caps. Tamiflu 75 мг по 1 капс 2р\в\с

- **2. Маханбетова 1987 г.р. СМП 05.12.2017г. палата №8.**
- Д/з: Хронический обструктивный бронхит, в стадии обострении
- Осл:ДН 2
- 3 беременность 15-16 недель.
- АД 120/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 78 в мин. ЧДД 18 в мин.
Т 36,5⁰С.

Лечение

Amoxicillin 1,0 + Natrii chloridi 0.9%-20 ml в\в стр 2 р\с

- Sol. Acidi Ascorbinici 5% - 4ml в\в стр
- Sol. Ambro 2ml в\м
- Sol. Glucosae 5%-200 ml в\в кап. 1 раз в сутки

- **З.Айманова А.К 1989 г.р. СМП 11.12.2017г. палата №4.**
- Д/з: Хронический обструктивный бронхит, в стадии обострении
- Осл: ДН 2
- 4 беременность 11-12 недель.
- Сопут: Железодефицитная анемия 2 степени.
- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 72 в мин. ЧДД 17 в мин.
Т 36,6°C.
-

Лечение

- Cef III 1,0 + Sol. Natrii chloridi 0,9%-100мл в/в кап X 1 раза в сутки
- Beroduali 2 мл через небулайзер 2 р\в\с
- Sol. Acidi Ascorbinici 5% - 4ml в\в стр
- Sol. Ambro 2ml в\м
- Sol. Trisoli 400мл в/в кап

- **В отделении нефрологии:2**
- **1.Қарабек Ж.Б. 1996г.р. СМП 11.12.2017г. палата №5.**
- Д/з: Хронический двусторонний пиелонефрит, обострение.
- Осл: ХБП 2 (СКФ- 82,7 мл\мин).
- Симптоматическая артериальная гипертензия
- Сопут: 1 беременность 5-6 недель
- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 86 в мин. ЧДД 17 в мин. Т 36,5⁰С.

Лечение

- Ampicillin 1,0 + Natrii chloridi 0.9%-10 ml в\в стр 4 р\с
- Tabl. Doregyti 250 mg по 1 табл 3р\в\с под конт АД.

- **2.Исабекова К.М. 1992г.р. СМП 08.12.2017г. 18:10. ГП №10.**
- Д/з: Хронический двухсторонний пиелонефрит, обострение.
- Осл: ХПН 0.
- Соп: 2 беременность раннего срока.
- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 84 в мин. ЧДД 19 в мин. Т 36,5 С.

Лечение

- Ampicillin 1,0 + Novocaini 0,5%-5мл в\м 4 р\с
- Sol. Analgini 50%- 2 ml+ Sol. Dimedroli 1%-1ml в/м 1р\в\с
- Sol. Acidi Ascorbinici 5% - 4ml в\в стр+Sol.Glucosae 5%-200 ml в/в кап. 1 раз в сутки
- Sol. Trisoli 400мл в/в кап

- **Отказы:**
- **1.Жолшибаева М 1987г.р СМП 13.12.2017г. 18:08. Пол-ка №6**
- Д/з: Цереброастенический синдром.
- Соп: 4 Беременность 11-12 недель.
- АД 110/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 76 в мин. ЧДД 19 в мин. Т 36,4 С.
- Оказана помощь. Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

- **2. Албул А.Ю 1979г.р. СМП 13.12.2017г. 19:40. Пол-ка №3**
- **Д/з:** Резидуальная энцефалопатия
- **Осл:** Синдром внутричерепной гипертензии
- Астено невротический синдром
- АД 110/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 78 в мин. ЧДД 17 в мин. Т 36,5 С.
- Оказана помощь. Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

Лечение

- Sol. Magnii Sulfatis 25% -10 ml + Sol. Natrii Chloridi 0.9%
-200ml в/в кап.

- **З.Молдабаев К 1948г.р. СМП 13.12.2017г. 19:50. Пол-ка ШГМБ**
- Д\з: Артериальная гипертензия 3 ст . риск 3.
- Осл: Криз 2 типа от 13.12.2017г.
- АД 140/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 78 в мин. ЧДД 18 в мин. Т 36,2 С.
- Оказана помощь. Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

Лечение

- Tabl. Captoprili 25mg 1 табл под язык
- Sol. Magnii Sulfatis 25% -5 ml + Sol. Natrii Chloridi 0.9% -5 ml
в/в стр.

- **4. Кошеров М 1968г.р. СМП 13.12.2017г. 19:40 .Пол-ка №10**
- Д/з: Артериальная гипертензия 3 ст . риск 3.
- Осл: Криз 2 типа от 13.12.2017г.
- АД 140/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 76 в мин. ЧДД 17 в мин. Т 36,6С.
- Оказана помощь. Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

Лечение

- Tabl. Captoprili 25mg 1 табл под язык
- Sol. Magnii Sulfatis 25% -5 ml + Sol. Natrii Chloridi 0.9% -5 ml
в/в стр.

- **5. Мухишева З 1989г.р. СМП 13.12.2017г. 20:20. Пол-ка №10**
- Д/з: Резидуальная энцефалопатия
- Осл: Синдром внутричерепной гипертензии
- АД 120/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 76 в мин. ЧДД 17 в мин. Т 36,6С.
- Оказана помощь. Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

Лечение

- Sol. Magnii Sulfatis 25% -5 ml + Sol. Natrii Chloridi 0.9%
-200ml в/в кап.

- **6. Айтжанова З.Б 1974г.р. СМП 13.12.2017г. 20:14.Пол-ка центр**
- **Д/з:** : Аллергическая реакция по типу Отека Квинке в области лица.
- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 78 в мин. ЧДД 17 в мин. Т 36,4⁰С.
- Оказана помощь. Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

Лечение

- Dexamethazoni 8 mg +Sol. Natrii chloridi 0,9%-200мл в/в кап.

- **7.Соколов В.Б 1954г.р СМП 13.12.2017г 20:32 Пол-ка №5**
- Д/з: Правосторонняя очаговая пневмония.
- АД 130/90 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 80 в мин. ЧДД 16 в мин. Т 37,4 С.
- Рекомендовано консультация фтизиатра.

Лечение

- Sol. Analgini 50%- 2 ml+ Sol. Dimedroli 1%-1ml в/м

- **8. Калтаева Ж 1979г.р. СМП 13.12.2017г. 20:30. Пол-ка ШГМБ**
- **Д/з:**Осн: Цирроз печени смешанной этиологии, класс В по Чайлд-Пью в стадии декомпенсации. Синдром портальной гипертензии в стадии компенсации
- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 74 в мин. ЧДД 18 в мин. Т 36,5 С.
- Показаний к экстренной госпитализации нет.
Рекомендовано госпитализация в плановом порядке

- **9. Абдикерим Э.М 1980г.р СМП 13.12.2017 г вр 19:500
Пол-ка №10**
- **Д/з: : Симптоматическая фокальная эпилепсия с
парциальными приступами 1-2 раз в**
- **Осл: Синдром внутричерепной гипертензии**
- **После родовой период 8 месяцев**
- **АД 110/60 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 78 в мин. ЧДД 18 в мин.
Т 36,6 С.**
- **Показаний для круглосуточного наблюдения нет, даны
рекомендации.**

Лечение

- Sol. Magnii Sulfatis 25% -5 ml + Sol. Natrii Chloridi 0.9% -200 ml в/в кап.

- **10. Заинилабдин Э.Т 1995г.р СМП 13.12.2017г 21:09
Пол-ка №5**
- **Д/з:** Цереброастенический синдром
- Соп6 2Беременность 18-19 недель
- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 82 в мин. ЧДД 16 в мин.
Т 36,5 С.
- Оказана помощь. Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

- **11.Нарботаева Н.Ж 1991г.р СМП 13.12.2017г 22:00
пол-ка №2**
- Д/з: : Аллергическая реакция по Отек Квинке лица,
неясной этиологии, средней тяжести
- АД 120/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 78 в мин. ЧДД 22в мин.
Т 36,5 С.
- Показаний для круглосуточного наблюдения нет.
Даны рекомендации.

Лечение

- Prednizaloni 30 мг +Sol. Natrii chloridi 0,9%-200мл в/в кап

- **12.Тойтелиева С.М 1987 г.р СМП 13.12.2017г 21:05 пол-ка Айнуры**
- Д/з: Аллергическая реакция по типу Отек Квинке в области лица, неясной этиологии, средней тяжести
- АД 120/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 72 в мин. ЧДД 17 в мин. Т 36,7 С.
- Оказано помощь.Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

Лечение

- Prednizaloni 30 мг +Sol. Natrii chloridi 0,9%-200мл в/в кап

- **13.Ырсалы С.С 1985г.р СМП 13.12.17 г вр 21:02 пол-ка №2**
- **Д/з:** Цереброастенический синдром.
- Показаний для круглосуточного наблюдения нет.
Даны рекомендации.
- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 76в мин. ЧДД 19 в мин.
Т 36,6 С.

- **14.Алимхан А.К 1999г.р СМП 13.12.17 г вр 22:50 пол-ка №10**
- **Д/з:** Аллергическая реакция по типу Отек Квинке в области лица, неясной этиологии, средней тяжести
- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 72 в мин ЧДД 19 в мин. Т 36,6 С.

Лечение

- Dexamethazoni 8 mg +Sol. Natrii chloridi 0,9%-200мл в/в кап.

- **15.Паримбаева Н.К 1990г.р СМП 13.12.17 г вр 22:30 пол-ка №6**
- **Д/з:** Остеохондроз шейного отдела позвоночника с болевым синдромом
- Соп: 3Беременность 7-8 недель
- АД 120/90 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 80 в мин. ЧДД 19 в мин. Т 36,5 С.
- Даны рекомендация стац лечение.Больная отказолся от госпитализации.Взято расписка

- **16. Маулешова А.Б 1979г.р СМП 13.12.17 г вр 22:52 пол-ка №7**
- **Д/з:**Артериальная гипертония 1 степени, риск 2
- Соп: 3Беременность 9 месяц.
- АД 110/70 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 76в мин. ЧДД 17 в мин. Т 36,6 С.
- Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

Лечение

- Sol. Magnii Sulfatis 25% -10 ml + Sol. Natrii Chloridi 0.9% -200 ml в/в кап.

- **17.Калтаева С.А 1987г.р СМП 13.12.17 г вр 23:02 пол-ка №2**
- **Д/З:** Межреберная невралгия слева.
- АД 120/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 72 в мин ЧДД 18 в мин. Т 36,6 С.
- Оказана помощь.Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

Лечение

- Sol. Analgini 50%- 2 ml+ Sol. Dimedroli 1%-1ml в/м
- Ketotopi 2 мл в/м .

- **18.Шажанова С.А 1983 г.р СМП 13.12.17 г вр 23:10 пол-ка Орынбаева**
- **Д/з:** Резидуальная энцефалопатия в стадии субкомпенсации
- Осл:Синдром внутричерепной гипертензии
- АД 110/60 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 80 в мин. ЧДД 19 в мин. Т 36,5 С.
- Оказано помощь.Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

Лечение

- Sol. Magnii Sulfatis 25% -5 ml + Sol. Natrii Chloridi 0.9% -200 ml в/в кап.
- Ketotopi 2 мл в/м

- **19. Секачева Г.М 1950г.р СМП 13.12.17 г вр 01:52 пол-ка №3**
- **Д/з:** Артериальная гипертония III ст , риск 3.
- АД 160/90 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 78 в мин. ЧДД 17 в мин. Т 36,4 С

- **21.Асанбаева Ш 1989 г.р СМП 14.12.17 г вр 00:55 пол-ка №5**
- **Д/з:**Осн: Хронический пиелонефрит в стадии обострение.
- После родовой период 227 сутки
- АД 110/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 74 в мин. ЧДД 19 в мин. Т 36,5 С.
- Оказано помощь.Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

- **22.Калыбаева Р 1964г.р СМП 13.12.17 г вр 23:50 пол-ка Чапаевка**
- **Д/з:** ХОБЛ. Бронхотический тип, категория С, фаза обострения.
- Осл: ДН -2
- Соп: Артериальная гипертония 3 ст.Риск 3
- АД 140/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 74 в мин. ЧДД 22 в мин. Т 36,5 С.
- Оказано помощь.Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

- **23.Секачева Г.М 1939г.р СМП 14.12.17 г вр 00:45 ДКБ**
- **Д/з: ХСН.ФК III (NYHA).**
- Фон: ИБС.НРС.Фибрилляция предсердие, постоянная форма
- Артериальная гипертония 3 риск 4
- АД 130/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 80 в мин. ЧДД 20 в мин. Т 36,5 С.
- Показаний к экстренной госпитализации нет.
Рекомендовано госпитализация в плановом порядке

- **24. Нурлыбаев Б.М 1989г.р СМП 14.12.2017г вр 03:05**
Достык
- Д\з: Остеохондроз шейного отдела позвоночника с болевым синдромом
- АД 110/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 74 в мин. ЧДД 19 в мин. Т 36,5 С.
- Оказано помощь.Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации

Лечение

- Ketotopi 2 мл+ Sol. Natrii Chloridi 0.9% -200 ml в/в кап.

- **25.Тиналиева Б.А 1958г.р СМП14.12.17г вр 02:45
полик№ 10**
- **Д\з:** Артериальная гипертония 3 ст . риск 3.
- Осл: Криз 2 типа от 13.12.2017г.
- АД 140/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 78 в мин. ЧДД 18 в мин. Т 36,2 С.
- Оказана помощь. Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации.

Лечение

- Sol.Furosemidi 1% -4ml в\в

- **26.Кенжетаева К.Б 1953г.р СМП 14.12.17г вр 01:55
Тогыс Шугыла 47**
- **Д\з:** ХОБЛ. Бронхотический тип, категория С, фаза обострения.
- **Осл:** ДН -2
- **Соп:** Артериальная гипертония 3 ст.Риск 3
- **АД 140/80 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 74 в мин. ЧДД 22 в мин.
Т 36,5 С.**

Лечение

- Sol. Euphyllini 2.4%- 10 ml+Dexamethazoni 8 mg +Sol. Natrii chloridi 0,9%-200мл в/в кап.

- **27.Зайнулла Б.К 1996г.р СМП 14.12.17г вр 04:23**
центр полик
- **Д\з:** Астено невротический синдром
- АД 110/60 мм.рт.ст. ЧСС=Пульс 80 в мин. ЧДД 19 в мин.
Т 36,5 С.
- Оказано помощь.Показаний для круглосуточного наблюдения нет. Даны рекомендации