



Снятие узловых швов

Преподаватель: Спевачова Е.А.

Снятие узловых швов

Снимать узловые швы надо через 5-7 дней их наложения. Если послеоперационная рана больших размеров, то снимать швы следует сначала через один, а на следующий день снять остальные.

Оснащение:

- ❑ стерильный лоток;
- ❑ резиновые перчатки;
- ❑ перевязочный материал;
- ❑ пинцеты анатомические;
- ❑ ножницы остроконечные;
- ❑ 1% раствор йодоната.














ИД **ОАО «Самарамедпром»**
Россия, 446100, Самарская обл., г. Чапаевск,
ул. Ленина, 99*6*. Тел. (846) 270-80-62
Раствор ЙОДА спиртовой 5%
Solutio Iodi spirituosa 5%
Хранить в защищенном от света месте,
при температуре не ниже 0°C
Р 70.529.34

Последовательность действий:

1. Надеть резиновые перчатки.
2. Обработать послеоперационную рану промокательными движениями раствором йодоната салфеткой на пинцете.
3. Взять анатомическим пинцетом за узелок шва и подтянуть его на себя.
4. Обрезать ножницами нить под узелком.
5. Удалить нить из тканей пинцетом.



- 
6. Обработать рану салфеткой с йодонатом на пинцете.
 7. Наложить сухую салфетку на рану пинцетом.
 8. Закрепить салфетку одним из способов.
 9. Отработанный инструмент и перевязочный материал поместить в разные емкости с дезинфицирующим раствором.
 10. Снять резиновые перчатки и поместить в емкость с дезинфицирующим раствором.