

*Солтүстік
Американың
табиғат зоналары
кордильердегі биіктік
белдеулері*

Солтүстік Америка табиғат зоналарының орналасуының өзіндік ерекшелігі бар. Солтүстігінде табиғат зоналары дәл Еуразиядағы сияқты тәртіппен батыстан шығысқа қарай тұтас белдеулер құрап, ендік бағытта таралады. Ал материктің орталығы мен оңтүстігінде табиғат зоналарының орналасуы меридиан бағытында жүреді. Бұл ең алдымен жер бедері мен климаттық жағдайларға байланысты. Сондықтан өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің түр құрамы солтүстігінде Еуразияға көбірек ұқсайды. Бұл материктердің көршілес орналасуы мен геологиялық даму тарихының ортақтығына байланысты.




*Арктикалық шөл
зоны материктің
солтүстігіндегі Гренландия аралы
мен Канаданың Арктикалық
архипелагын алып жатыр. Қысқа,
әрі суық жаз мезгілінде мұз бен
қардан бос батпақты, тасты
жерлерде сирек мүк пен қына
өседі. Бұл зонада мұз дәірінен бері
сақталып қалған қойөгіз тіршілік
етеді. Оның қалың, әрі ұзын қара-
қоңыр жүні суықтан жақсы
қорғайды. Қой-өгіз ерекше қорғауға
алынып, Дүниежүзілік Қызыл
Кітапқа енгізілген.*



Тундра зонасы материктің солтүстік жағалық бөлігі мен Гудзон шығанағының оңтүстігін, Лабрадор түбегін қамтиды. Табиғат жағдайлары Еуразиядағы тундра зонасымен ұқсас. Солтүстік Американың тундра зонасына солтүстік бұғыларының айрықша түрі – карибу тән. Тундра зонасы батысында Кордильераға қарай таулы тундраға, ал оңтүстігінде ағаштар араласып, орманды тундраға, одан біртіндеп тайгаға ұласады.



Тайга зонасы Кордильераның шығыс беткейінен басталып, Атлант мұхитына дейінгі кең алапты алып жатыр. Топырағы күлгін. Қылқан жапырақты ағаштардан қара және ақ шырша, көгілдір шырша, бальзамды май қарағай, америка бал қарағайы және қарағайлардың бірнеше түрі кездеседі. Жануарлардан қара аю – барибал, гризли аюы, канада сілеусін, америка қара күзені, бұлан, вапити бұғысы мекендейді, қорықтарда орман бизоны сақталған.





ЕМЕН



ҚАЙЫҢ



ТАЛ



ШЫРША



ЖӨКЕ



ҚАРАҒАЙ

Аралас және жалпақ жапырақты, ауыспалы ылғалды ормандар материктің климаты анағұрлым ылғалды, жұмсақ болып келетін шығыс бөлігін бойлай, оңтүстікте Мексика шығанағы жағалауына дейін таралған. Аралас ормандарға орманның сұр топырағы, жалпақ жапырақты ормандарға орманның қоңыр топырағы, ал ауыспалы ылғалды ормандарға сары және қызыл топырақтар тән болады. Аралас ормандарға сары қайың, қант үйеңкісі, шамшат, жөке, ақ және қызыл қарағай басым өседі.

Жалпақ жапырақты
ормандарда емендердің ондаған түрі,
каштан, платан, қызғалдақ ағашы,
орман жаңғағы, жапырағын түсіретін
магнолия, жабайы жеміс ағаштары
өседі. Бұл ормандар Аппалач тауының
биік бөліктерінде ғана сақталып қалған.
Ауыспалы ылғалды ормандар
субтропиктік белдеуде таралған. Мұнда
қарағайдың субтропиктік түрлері мәңгі
жасыл және жапырағын түсіретін
ағаштар: шамшат, емен, магнолия,
орман жаңғағы мен аралас өседі. Құрғақ
жерлерде қарағай мен ергежейлі сабаль
пальмасы, өзен бойларындағы
батпақтарда осы жерге ғана тән батпақ
кипарисі таралған. Флорида түбегінің
оңтүстігінде арнайы қорғауға алынған
Эверглейдс батпағы орналасқан.



ЕМЕН



ҚАЙЫҢ



ТАЛ



ШЫРША



ЖӨКЕ



ҚАРАҒАЙ