

Тварини



**ВИКОНАВ:
СЕРГІЄНКО
КИРИЛ**



КРОКОДИЛ

Крокодили- загін водних хребетних (яких зазвичай відносять до збірної групи « плазунів »). В рамках кладистики крокодили розглядаються як єдиний вижив субклад ширшого скарбу круротарзів.). Вважається, що крокодили з'явилися близько 250 млн років тому в тріасовому періоді. З нині живучих організмів найближчі родичі крокодилів - птахи (близькі родичі або навіть нащадки архозаврів). Всі нинішні крокодили - напівводні хижаки, що використовують в їжу водних, навколоводних і приходять на водопій тварин.



СОВА

Совоподібні - загін хижих птахів, що включає більше 420 великих і середньої величини видів, в основному нічних птахів, поширених у всіх країнах світу. У загоні два сімейства: совині , або справжні сови, і сипухові , проте в таксономії Сіблі-Алквіста в загін поміщаються всі сімейства загону дрімлюгоподібні

Коротка характеристика: велика голова, великі круглі очі спереду голови, дзьоб короткий, хижий. Полює вночі, оперення м'яке, політ безшумний, кігті довгі і гострі, окрас маскує.





ЛИСИЦЯ

Лисиця звичайна або руда найбільш розповсюджений та широко відомий вид роду лисиць родини Псові. Вона також є найбільшим видом роду: довжина тіла 60–90 см, хвоста — 40–60 см, маса 6–11 кг. У більшості випадків забарвлення спини яскраво-руде, часто з неясним темним візерунком, черево біле, іноді чорне. Забарвлення у тварин з південних районів ареалу тьмяніше. Поряд з типово забарвленими «вогнівками» зустрічаються особини з темнішим хутром: сиводушки, хрестовки, чорно-бурі. Зрідка в природі зустрічаються альбіноси





ВЕДМІДЬ БІЛИЙ

Ведмі́дь бі́лий є найбільшим представником родини Ведмедєвих, і, одночасно, найбільшим сучасним сухопутним хижаком; в харчових ланцюгах Арктики він уособлює найвищий рівень. Цей звір добре адаптований до умов свого існування: його щільне хутро та товстий шар жиру добре ізолюють організм тварини від холоду, білий колір чудово маскує при полюванні. Завдяки таким адаптаціям білий ведмідь здатний полювати на суходолі, на морській кризі, а також у воді.





ЛЕОПАРД

Леопард , або **барс** ,
або **пантера**- вид
хижих ссавців сімейства
котячих, один з чотирьох
представників
роду пантера що
відноситься до
підродини великих
кішок .





ЧЕРЕПАХА


Черепахи- один з чотирьох загонів плазунів , викопні останки яких простежуються протягом більше 220 мільйонів років. Загін містить близько 328 сучасних видів, згрупованих в 14 сімейств і два підряди, поширених в тропічній і помірній кліматичних зонах майже по всій Землі і живуть як у воді, так і на суші. Відмітною ознакою черепах є панцир, що складається з двох частин, карапакса і пластрона . Панцир служить черепахам основним захистом від ворогів.





МАВПА

Мавпи - чотирирукому ссавці , які мають найтісніший контакт людині за будовою тіла і походженням, в широкому сенсі - всі представники загону приматів. Слово «мавпа» з'явилося в давньоруській мові як запозичення і стало широко відомо після видання « Ходіння за три моря » Афанасія Нікітіна. У словнику Д. Н. Ушакова уточнюється, що в арабському означає «батько розпусти».



Слон

Слон -
сімейство ссавців загону
хоботних . До цього
сімейства в наш час
відносяться найбільші
наземні ссавці.



ЗЕБРА

Зебра- підрид роду коні , до складу якого види зебра бурчеллова , зебра Греві і гірська зебра. Гібридні форми між зебрами і домашніми кіньми називають зеброїда , між зебрами і ослами - зебулами . Зебри живуть маленькими групами, що складаються з самок з дитинчатами і одного жеребця.



Порося

Порося - сімейство нежуйних парнокопитних , що включає 8 видів, в тому числі єдиного європейського представ-ника сімейства - дикого кабана , який є прабатьком домашньої свині . Дитинча свині називається поросям.



МИША

Ми́ша—
рід ссавців родини Мишо-
вих з ряду Гризунів, що
включає близько 38-40
сучасних видів, у тому
числі низку видів-
двійників і форм
неясного таксономічного
рангу. Рід *Mus* є
типовим для родини
Мишових і, відповідно,
надродини Мишуватих та
підряду Мишовидих.
Типовий вид
роду — миша звичайна,
або хатня — всесвітньо
поширений (разом з
людиною) вид ссавців.



СОКІЛ

Сокіл — рід хижих птахів родини соколових. Наукова назва *Falco* є похідною від латинського слова *falx* («серп») і підкреслює серпоподібну форму крил у польоті. Соколи залишили багату культурну спадщину в багатьох світових культурах, у тому числі і в Україні.



БІЛКА

Білка -

рід гризунів сімейства
болючих. Крім власне
роду *Sciurus*, білками
називають ще цілий ряд
представників сімейства
болючих з родів червоні
білки, пальмові білки і
багатьох інших. Що
стосується власне
роду *Sciurus*, то він
об'єднує в себе близько
30 видів, поширених
в Європі, Північній
і Південній Америці та в
помірному поясі Азії.



ВЕДМІДЬ

Ведмі́дь — центральний рід в родині Ведмедеві.

Рід об'єднує найбільш типових та знаних представників родини, і на його основі сформовані загальні систематичні критерії віднесення тварин до неї.

Відповідно до палеонтологічних відомостей, рід Ведмідь з'явився 5-6 мільйонів років тому. Першим його представником на теперішній час вважають ведмедя малого, *Ursus minimas* — відносно невелику тварину, чий викопні рештки знайдені на території Франції.

Всі сучасні чотири види роду, а також ряд вимерлих (таких, наприклад, як печерний ведміль походять від етрускського ведмедя, що жив 2-1 мільйони років тому.



ЖИРАФА

Жира́фа або жира́ф — ссавець клади китопарно-копитних родини жирафових, єдиний вид у своєму роді. Найвища наземна тварина на планеті. Щоб відрізнити від родича — окапі («лісової жирафи»), — жирафу часом називають «степовою жирафою»



ЛОСЬ

Лось - найбільший представник в сімействі Оленьово. Він також є найвищим після жирафа копитним тваринам. Але якщо жираф досягає такої висоти за рахунок довгої шиї, то лось істинний велетень. На лосів споконвіку полювали, але ставлення до цього звіра було не чисто споживчим, а шанобливим. Серед американських індіанців носити ім'я Лося вважалося почесним.





Їжак білочеревий

Їжа́к білочеревий —
вид ссавців родини їжако-
вих





Сіамський кіт

Сіамські кіт – це порода маленьких легких котів з довгою клиноподібною головою. Завдяки особливому забарвленню кінцівок, яке не властиве більше жодним породам котів, сіамського кота практично неможливо не впізнати. Також ці коти популярні завдяки своїй первозданності, адже протягом всієї їхньої історії їх не схрещували з іншими породами.





Золотистий ретривер

Золотистий ретривер ,
або **Голден ретривер** -
мисливська порода собак,
виведена
в Великобританії в XIX
столітті . За
класифікацією МКФ нале
жить до 8 групі
(ретривери, спанієлі,
водяні собаки) 1 секції
(ретривери). Стандарт
породи був описаний
в 1913 році .

